

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Innehållsansvar: Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-11

Giltig till: 2027-04-07

## Flödesschema komplex obstipation, Barnkliniken

---

### Nybesök planerad remiss:

- Besök skall planeras in när urotarmterapeut är i tjänst, möjlighet till rektalt ultraljud som utgångsvärde.

### Akutbesök/planerade åb dagtid:

- Vid behov kontakta urotarmterapeut för råd angående fortsatt utredning och uppföljning.
- Initialt ultraljud rektum om urotarmterapeut är i tjänst. I annat fall vid uppföljning.

### Akutbesök kvällar/helger:

- Vid behov kontakta urotarmterapeut för råd angående fortsatt utredning och uppföljning när de är i tjänst.
- Vid önskemål om fortsatt uppföljning av tarmbesvär kopia av journalanteckning till urotarmterapeut.
- OBS! Se till att kontaktuppgifter finns till vårdnadshavare.

### Tänk på att det här ska vara gjort innan patienten kommer till urotarmterapeut:

- IgA-transglutaminas bör vara taget.
- Laxantia bör vara insatt och uppföljt vid obstipationsmisstanke.

## Följande patienter lämpar sig för en bedömning på urotarmterapi:

- Patienter som fortsätter ha obstipationsbesvär trots insatt behandling med makrogolpreparat och goda toalettvanor.
- Patienter som fortsätter ha avföringsläckage trots insatt laxantia behandling.
- Vid insättande av vattenlavemang.
- Vid misstanke om obstipation hos barnklinikens patienter är urotarmterapi gärna behjälpliga med ultraljud rektum som ett steg i utredningen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Barn- och ungdomssjukvård

**Innehållsansvar:** Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

**Godkänd av:** Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10035-986315719-91

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-04-11

**Giltig till:** 2027-04-07