

Gäller för: Endokrinologimottagning NÄL, Diabetesmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-23

Giltig till: 2027-07-23

# Tyreostatikabehandling

## Förändring sedan föregående version

Inga justeringar i denna version.

## Åtgärder

Patienter som behandlas med tyreostatika, det vill säga Thacapzol eller Propycil har en ökad risk att utveckla agranulocytos vilket kan leda till allvarlig sepsis. Det är därför av yttersta vikt att patienter som behandlas med dessa läkemedel kontrollerar både LPK och Diff (där neutrofiler ingår) om de får feber, halsont eller dylikt. Om normala värden kan patienten åter börja med Thacapzol eller Propycil. Vid ev neutropeni (neutrofiler  $<0,5$  E9/L) utsättning Thacapzol/Propycil och kontakt med infektionsläkare.

Vid neutrofiler 0,5 – 1,7 fortsatt utsättning av Thacapzol/Propycil, förnyad provtagning av diff dagen efter samt kontakt med endokrinolog så snart som möjligt.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Endokrinologimottagning NÄL, Diabetesmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10039-1260372692-27

**Version:** 18.0

**Giltig från:** 2025-07-23

**Giltig till:** 2027-07-23