

Gäller för: Diabetesmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

Granskad av: Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-10

Giltig till: 2027-06-10

Glukoskontroller på vårdavdelningar

Förändring sedan föregående version

Inga förändringar.

Syfte

Vägledande information om hur glukoskontroller ska göras på patienter med diabetesbehandling under vårdtid på avdelning.

Åtgärder

- Om patienten har måltidsinsulin skall p-glukos kontrolleras x 7, d.v.s. före alla måltider, 1,5 timme efter alla måltider samt före natten, åtminstone de första dygnet.
- Om patienten har mixinsulin eller medellångverkande/långverkande insulin skall p-glukos kontrollera x 4 (före måltider och före natten).
- Om patienten har tablett- eller kostbehandling bör p-glukos kontrolleras x 4 första dygnet, därefter beroende på metabol kontroll.

Vid akut sjukdom som akut koronart syndrom, sepsis, stroke el dylikt skall p-glukos kontrolleras x 7 minst.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diabetesmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

Granskad av: Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10039-1260372692-3

Version: 17.0

Giltig från: 2025-06-10

Giltig till: 2027-06-10