

Gäller för: AK-mottagning

Innehållsansvar: Marika Väre, (marva29), Sjuksköterska

Granskad av: Lars Wennerström, (larwe11), Specialistläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-11

Giltig till: 2027-11-11

# Waranbehandling - åtgärder för medicinjouren vid höga PK

## Förändringar sedan föregående version

Mindre justeringar i hela dokumentet. Förtydligande av syfte.

## Bakgrund och syfte

Inom Fyrbodal har vi centraliserad AK-mottagning där provtagningen av PK (INR) ordinerar av AK-mottagningen NU-sjukvården. Under AK-mottagningens öppettider hanteras avvikande provsvar där men under jourtid övertas detta av jourorganisationen varvid Medicinjouren kontaktas vid höga PK-värden.

Syftet med denna rutin är att tydliggöra handläggning/åtgärder för medicinjouren vid höga PK värden som inkommer utanför AK-mottagningens öppettider.

## Åtgärder för medicinjouren

Patienten eller ansvarig vårdpersonal kontaktas, tänk på att vissa patienter har läkemedelsövertag, kontaktuppgifter till hemsjukvård kan exempelvis hittas i AK-journalen. Orsaker till det höga värdet efterfrågas samt om det finns blödnings symptom. Dokumentera i Melior.

### **PK-INR > 8 och ingen påvisbar blödning**

- Uppehåll med Waran 2–3 dagar
- Om inga blödningssymtom eller inga hållpunkter för ökad blödningsrisk behöver inte Konakion ges
- Konakion 2 mg vid hög blödningsrisk/lågt kostintag

### **PK-INR > 6.0**

- Uppehåll 2 dagar
- Konakion 2 mg p.o. om hög blödningsrisk/lågt kostintag

### **PK-INR 4.0–6.0**

- uppehåll 1–2 dagar

### **PK-INR 3.0–3.9**

- ½ ordinarie dos (eller uppehåll 1 dag).

**Journalkopia/meddelande FAXAS till AK-mottagningen och patienten uppmanas kontakta AK-mottagningen nästföljande vardag.**

## **Handläggning vid blödning**

Patienten tillsägs att söka akutmottagning. Anvisningar angående Konakiontillförsel på akutmottagningen finns i: [Venös tromboembolism och antikoagulantibehandling hos vuxna och vid graviditet \(vgregion.se\)](#)

### **Konakion 10 mg/ml**

Konakion lösning för intravenös injektion (10mg/ml) kan också ges peroralt. Dosen är densamma, det vill säga 0,2 ml av den ”intravenösa lösningen” är 2 mg Konakion.

I första hand ges Konakion peroralt på en sockerbit på grund av dålig smak.

## Källförteckning

[Venös tromboembolism och antikoagulantibehandling hos vuxna och vid graviditet \(vgregion.se\)](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** AK-mottagning

**Innehållsansvar:** Marika Väre, (marva29), Sjuksköterska

**Granskad av:** Lars Wennerström, (larwe11), Specialistläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10041-1023055308-3

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2025-11-11

**Giltig till:** 2027-11-11