

Läkemedel som ges till vuxna utan särskild läkarordination på avdelning 45

Bakgrund och syfte

Enligt SOSFS (M)1995:19 får läkemedel utdelas av sjuksköterska enligt *skriftliga generella direktiv*.

Ordination enligt generella direktiv ska ske med stor restriktivitet och omprövas årligen. Läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinerings. Given dos ska registreras med signatur av sjuksköterska.

Förteckning indikationer och läkemedel

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm. sätt	Anvisning med indikation, kontraindikation, max antal tillfällen innan läkarordination samt anmärkning
Alvedon tablett 500 mg	1-2 st	4	8 st	po	Indikation: Smärta, feber. I första hand
Cilaxoral orala droppar 7,5 mg/ml	10 drp	1	10 drp	po	Indikation: Obstipation.
Combivent lösning för nebulisator 0,5 mg/2,5 mg	1 förp	1	4 förp	inhal	Indikation: Luftrörsvidgande. Kontraindikation: Hypertrof, obstruktiv kardiomyopati.
Conoxia Medicinsk gas, komprimerad 100 %	15 l	1	15 l	enl ord	Indikation: Hypoxi O2. Ring jousen omedelbart.
Desloratadin tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Klåda, allergi.
Gaviscon oral suspension	10 ml	1	10 ml	po	Indikation: Sura uppstötningar och halsbränna.

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm. sätt	Anvisning med indikation, kontraindikation, max antal tillfällen innan läkarordination samt anmärkning
Glukos injektionsvätska 300 mg/ml	10 ml	1	10	iv	Indikation: Hypoglykemi. Medvetandepåverkan Ring jousen omedelbart.
Hexident Munsckölj 1 mg/ml	10 ml	3	30 ml	po	Indikation: Antiseptiskt munvårdsmiddel.
Laktulos oral lösning 760 mg/ml	15 ml	1	15 ml	po	Indikation: Obstipation.
Laxiriva pulver till oral lösning dospåse	1 dos	1	dos	po	Indikation: Obstipation.
Naproxen tablett 250 mg	1 st	2	2 st	po	Indikation: Smärta. I andra hand. Obs! Ges inte till äldre hjärt/njursjuka eller blödningsrisk.
Nezeril näsdroppar 0,5 ml/ml	1-2 doser	2	2 doser	nasalt	Indikation: Nästäppa. En pipett i vardera näsborre.
Paracetamol lösning 10 mg/ml	100 ml	1	100 ml	enl ord	Enbart när patient inte kan svälja. Om opåverkad eller yngre, ingen behandling.
Pevaryl kräm 1 %	1 dos	2	2 doser	utvärtes	Indikation: Hudinfektion med svamp.
Pevisone kräm 1 mg/ml	1 dos	1	1 dos	utvärtes	Initialbehandling vid eksematiserande dermatomykoser med subjektiva besvär i form av klåda och irritation.
Postafen tablett 25 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Illamående. Inte till gravida och endast vid lätta besvär.
Ringer-Acetat lösning	1000 ml	1	1000 ml	iv	Indikation: Septisk chock. Hypotension vid infektion. Flushas in. Ring jousen omedelbart.
Scheriproct rektalsalva 0,19 %/0,5 %	1 dos	1	1 dos	rektalt	Indikation: Vid hemorrojder.
Stesolid rektallösning 5 mg	1 st	1	1 st	rektalt	Indikation: Kramp. Ring jousen omedelbart.
Zolpidem tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Sömnbesvär, 1 st till natten. I andra hand.
Zopiklon tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Sömnbesvär, 1 st till natten. I första hand.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologimottagning - dagvård Uddevalla sjukhus,
Avdelning 45 NÄL

Innehållsansvar: Johanna Abellsson, (johma11), Överläkare

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10041-1895626389-25

Version: 1.0

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11