

Gäller för: Avdelning 51 NÄL

Innehållsansvar: Mikael Sundström, (miklu10), Vårdenhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-26

Giltig till: 2026-11-26

# Skötsel av patient med cytostatikabehandling

## Förändringar sedan föregående version

Endast redaktionella ändringar

## Bakgrund och syfte

För att all personal ska kunna jobba på ett säkert sätt med dessa patienter utan att riskera sin egna hälsa.

## Märkning av vårdplats

- Patientrum märks med en gul prick, så att all berörd personal uppmärksammas på att rutiner för cytostatikabehandlade patient ska följas.
- Sängen märks med gul prick. Det ska framgå vilket datum patienten avslutat behandlingen, märkningen tas bort 5 dygn efter avslutad behandling.
- Urin, avföring, svett, kräkning och blod betraktas som farligt avfall upp till 5 dygn efter administreringen av cytostatikan.
- Patienten behöver inte vårdas på enkelrum.

## Personlig skyddsutrustning

- Handskar, Nitril avsedd för cytostatika
- Skyddsrock, lång ärm med mudd, avsedd för cytostatika. Byts vid kontaminering.

- Andningsskydd FFP 3
- Skyddsglasögon

## Avfall

- Tvätt läggs i vattenlöslig tvättpåse.
- Sopor läggs i gul behållare med lock.

## Spill

- Täck spillet med underlägg/blöja, torka upp med svepande rörelser.
- Torka av med vatteninträckt trasa (vatten neutraliserar cytostatika)
- Tvätta med ytdesinfektion

## Toalettbesök

- Patienten ska sitta ner och kissa.
- Toaletten ska spolas 2 gånger med locket nedfällt.
- Om patienten använder bäcken eller urinflaska, ska urinen svalna innan den hälls ut. Detta för att minska risken för ångor vid tömning.
- Inkontinenta patienter kan behöva kateteriseras, behov bedöms av läkare. Kan patienten inte tömma sin KAD själv på toaletten ska icke tömbara påsar användas, dessa slängs direkt i farligt avfall, utan att klippas upp (gul avfallstunna).

## Blod

- Vid hantering av blod i provrör eller andra slutna system behöver ingen särskild försiktighet vidtas.

## Cytostatika tabletter

- Får inte tas med fingrar, använd pincett. Om patienten behöver assistans vid distribueringen - använd sked eller håll tabletten i munnen utan att ta i dem.

## Avliden patient

- På remissen till obduktion av avliden patient, som de senaste 5 dyggen fått cytostatika ska uppgift om detta anges.
- Avfall och tvätt hanteras som ovan.

## Informationsöverföring mellan enheter/vårdgivare

- I samband med vård hos andra enheter/vårdgivare såsom operation, röntgen, labb, transporter där vård kan ges samt hemsjukvård, informera om att patienten kan utsöndra cytostatika, så att de kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

## Observera

Gravid personal ska inte hantera utsöndringar i form av urin, kräkningar eller avföring från cytostatikabehandlade patienter.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Avdelning 51 NÄL

**Innehållsansvar:** Mikael Sundström, (miklu10), Vårdenhetschef

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10065-1556658966-44

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-11-26

**Giltig till:** 2026-11-26