

Gäller för: Lungmottagning NÄL

Innehållsansvar: Johannes Johansson, (johjo59), Specialistläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-09

Giltig till: 2027-12-09

Betapredschemata

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund och syfte

Dokumentet syftar till att på ett överskådligt sätt sammanställa de dos-schemata som används inom Lungmedicin, NÄL. Inom lungonkologin presenterar patienter med tillstånd som kräver höga doser Betapred. Användning sker främst vid primärtumör i torax, hjärnmetastaser och skelettrelaterade metastaser som symptomatisk ansvällande behandling – i doser som trappas ned över tid. Tabletterna kan lösas i en liten mängd vatten och intas per oralt (p.o.). Om p.o. intag ej är möjligt kan doserna ges intravenöst (i.v.). Betapred har en minimal mineralokortikoid effekt. Behandlingar ges i kurer om 1–3 veckor med målsättning att helt kunna sättas ut.

Övriga observandum:

1. Anamnes på tidigare gastrit/ulcer, reflux eller annan sjukdom som yrkar på samtida PPI-behandling.
 - Överväg insomningstablett vid behov.
2. Överväg glukoskontroll och PM snabbverkande insulin.

Behandlingen kan delas in beroende på etiologi (och dosutförande):

- A. Hjärnmetastaser – (tvådos)
 - a) Högdos
 - b) Lågdos
- B. Cancerrelaterad smärta – (endos)
 - a) Högdos
 - b) Lågdos
- C. Illamående
 - a) I kombination med antiemetika

Utförande

Hjärnmetastaser

HÖGDOS	TVÅDOS
Dygn	Dosering T Betapred 0,5 mg (st)
1	16 + 16 + 0
2	12 + 12 + 0
3	8 + 8 + 0
4	8 + 8 + 0
5	6 + 6 + 0
6	4 + 4 + 0
7, tills vidare	4 + 4 + 0

LÅGDOS	TVÅDOS
Dygn	Dosering T Betapred 0,5 mg (st)
1	8 + 8 + 0
2	8 + 8 + 0
3	6 + 6 + 0
4	4 + 4 + 0
5	4 + 4 + 0
6	4 x 1
7, tills vidare	4 x 1

Fortsättning på nästa sida.

Cancerrelaterad smärta^[1]

HÖGDOS	ENDOS
Dygn	Dosering T Betapred 0,5 mg (st)
1	32 + 0
2	32 + 0
3	32 + 0
4	24 + 0
5	20 + 0
6	16 + 0
7	12 + 0
8	8 + 0
9	4 + 0
10	0

LÅGDOS	ENDOS
Dygn	Dosering T Betapred 0,5 mg (st)
1	16 + 0
2	16 + 0
3	16 + 0
4	16 + 0
5	12 + 0
6	8 + 0
7	6 + 0
8	4 + 0
9	2 + 0
10	0

Akut Illamående

Betapred 8 mg i.v. + **Zofran** (Ondansetron) 4-8 mg i.v.

Relaterade rutiner

1. *"Steroidbehandling vid cancerrelaterad smärta"* – Smärtbehandlingsenheten
Norra Älvsborgs Länssjukhus, NU-sjukvården

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Lungmottagning NÄL

Innehållsansvar: Johannes Johansson, (johjo59),
Specialistläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10065-776977986-16

Version: 1.0

Giltig från: 2025-12-09

Giltig till: 2027-12-09