

# Njurbiopsi checklista

## Förändringar sedan föregående version

Mindre språkliga justeringar i denna revision.

## Bakgrund och syfte

Att skapa en tydlig och lättförståelig arbetssätt som en del av kvalitetsarbetet runt njurbiopsi. Att förtydliga vikten av samsyn gällande avdelningens rutiner.

Undersökningsdag: \_\_\_\_\_

Patientetikett

## Förberedelser

Inskrivningssamtal om patient kommer hemifrån.

Informerationssamtal.

NEWS. Observera blodtryck får ej överstiga (150/85 mmHg)

ID- kontroll och ID-band sätts på.

Sätt PVK

- Kontrollera att prover är tagna och signerade. Om blodprover ej är tagna på vårdcentralen skall följande prover tas: Blodstatus, elstatus, PK, APTT.
- Urinsticka
- BAS- test
- Blodgruppering (om inte gammal finns)
- Skriv ut lab- etiketter (ska skickas med till röntgen)
- Premedicinering ordinerar av läkare. [enligt rutin Q.Di 710](#)
- Förberedd med transportbox och lägg remissen i boxen (i mån av tid)
- Kontakta transplantationslaboratoriet patologen och meddela ankomstdagen för biopsi (031- 3426674)

## Biopsidagen

- Fasta från klockan 00:00
- Morgonmedicin ska ges klockan 06:00
- Patientskjorta
- Blodtrycket kontrolleras, Observera får inte överstiga 150/85. Om kvarstående förhöjt blodtryck >150/85 efter en timme kontakta njurläkare)
- Ge premedicinering enligt ordination 1 timme före biopsi:**
  - T. Stesolid 5 mg
  - T. Paracetamol 1000 mg
  - Om kreatinin >150 eller GFR <45 ska injektion Octostim (ges subkutant) ordinerar.

## Tas med till röntgen

- Transportbox avsedd för njurbiopsi märkt med adressen till Patologen, Gula stråket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset AKUT.
- PAD- remiss läggs i transportboxen
- Lab- etiketter till preparatburk (preparatburk tillhandahavs av röntgen)

## Efter biopsi

- Transportboxen med preparatet lämnas till Kemlab.
- Observation av blodtryck, puls, stickställe (var god se observation efter biopsi)
- Får dricka först efter 1 timme efter biopsi (rikligt med dryck).  
Klockan \_\_\_\_\_
- Får äta 4 timmar efter biopsin om inga komplikationer tillstött.  
Fasta till klockan \_\_\_\_\_
- Strikt sängläge på sticksidan första timmen för att minska blödningsrisk, följt av 3 timmar strikt sängläge på rygg. Sängläge till klockan \_\_\_\_\_
- Huvudändan får höjas 40 grader två timmar efter biopsin.
- Mellan 4:e och 7:e timmen gäller sängläge och patienten får gå upp vid behov (men helst inte).

Efter 7 timmars observation och förutsatt att inga komplikationer uppstått kan patienten gå hem. Vid osäkerhet om patientens hemgång kontaktas njurjouren.

## Observation efter biopsi

- Blodtryck och puls var 15:e minut i 2 timmar. Därefter var 30:e minut tills blodtrycket har varit stabilt i 2 timmar. Använd observationsjournal

Kontroll av allmäntillstånd och stickställe med samma frekvens som blodtryckskontrollerna.

Kontrollera urinens färg. Vid påtaglig makrohematuri kontaktas njurläkare. Kan bli aktuellt med hematuri- KAD.

**Vid misstanke om blödning kontakta dialysläkare. Efter klockan 16:00 kontaktas njurjouren. Kontrollera akut Hb. Akut ultraljud (ring röntgenjour).**

**Symtom som kan ge misstanke om blödning: smärta, illamående, blekhet, takykardi, makroskopisk hematuri, urinträningar, hb- sänkning (särskilt >20g/l), blodtrycksfall (< 100/70 mmHg) eller kreatininstegringar.**

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Avdelning 42 NÄL

**Innehållsansvar:** Amira Abdallah, (amish3), Teamledare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-1238851106-21

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2026-06-01

**Giltig till:** 2028-06-01