

Njurbiopsi checklista

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund och syfte

Att skapa en tydlig och lättförståelig arbetssätt som en del av kvalitetsarbetet runt njurbiopsi. Att förtydliga vikten av samsyn gällande avdelningens rutiner.

Undersökningsdag: _____

Patientetikett

Förberedelser

Inskrivningssamtal om patient kommer hemifrån.

Informerationssamtal.

NEWS. Observera blodtryck får ej överstiga (150/85 mmHg)

ID- kontroll och ID-band sätts på.

- Kontrollera att prover är tagna och signerade. Om blodprover ej är tagna på vårdcentralen skall följande prover tas: Blodstatus, elstatus, PK, APTT.
- Urinsticka
- BAS- test
- Blodgruppering (om inte gammal finns)
- Skriv ut lab- etiketter (ska skickas med till röntgen)
- Premedicinering ordinerar av läkare. [enligt rutin Q.Di 710](#)
- Förberedd med transportbox och lägg remissen i boxen (i mån av tid)
- Kontakta transplantationslaboratoriet patologen och meddela ankomstdagen för biopsi (031- 3426674)

Biopsidagen

- Fasta från klockan 00:00
- Morgonmediciner ska ges klockan 06:00
- Patientskjorta
- Blodtrycket kontroll (Obs får inte överstiga 150/85. Om kvarstående förhöjt blodtryck >150/85 efter en timme kontakta njurläkare)
- Ge premedicinering enligt ordination 1 timme före biopsi:**
 - T. Stesolid 5 mg
 - T. Paracetamol 1000 mg
 - Om kreatinin >150 eller GFR <45 ska injektion Octostim (ges subkutant) ordinerar.

Tas med till röntgen

- Transportbox avsedd för njurbiopsi märkt med adressen till Patologen, Gula stråket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset AKUT.
- PAD- remiss läggs i transportboxen
- Lab- etiketter till preparatburk (preparatburk tillhanda havs av röntgen)

Efter biopsi

- Transportboxen med preparatet lämnas till Kemlab.
- Observation av blodtryck, puls, stickställe (var god se observation efter biopsi)
- Får dricka först efter 1 timme efter biopsi (rikligt med dryck).
Klockan _____
- Får äta 4 timmar efter biopsin om inga komplikationer tillstött.
Fasta till klockan _____
- Strikt sängläge på sticksidan första timmen för att minska blödningsrisk, följt av 3 timmar strikt sängläge på rygg. Sängläge till klockan _____
- Huvudändan får höjas 40 grader två timmar efter biopsin.
- Mellan 4:e och 7:e timmen gäller sängläge och patienten får gå upp vid behov (men helst inte).

Efter 7 timmars observation och förutsatt att inga komplikationer uppstått kan patienten gå hem. Vid osäkerhet om patientens hemgång kontaktas njurjouren.

Observation efter biopsi

- Blodtryck och puls var 15:e minut i 2 timmar. Därefter var 30:e minut tills blodtrycket har varit stabilt i 2 timmar. Använd observationsjournal

Kontroll av allmäntillstånd och stickställe med samma frekvens som blodtryckskontrollerna.

Kontrollera urinens färg. Vid påtaglig makrohematuri kontaktas njurläkare. Kan bli aktuellt med hematuri- KAD.

Vid misstanke om blödning kontakta dialysläkare. Efter kl 16 kontaktas njurjouren. Kontrollera akut Hb. Akut ultraljud (ring röntgenjour)

Symtom som kan ge misstanke om blödning: smärta, illamående, blekhet, takykardi, makroskopisk hematuri, urinträningar, hb- sänkning (särskilt >20g/l), blodtrycksfall (< 100/70 mmHg) eller kreatininstegr

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 42 NÄL

Innehållsansvar: Emma Johansson, (emmjo34), Specialsjuksköt

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-1238851106-21

Version: 2.0

Giltig från: 2024-07-12

Giltig till: 2026-07-12