OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Elin Ågren, (eliag2), Sjuksköterska
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-17
Giltig till: 2028-11-17

Q Di 403 Avslut av dialysbehandling via AV-fistel/AV-graft

1 ex i avdelningspärm
Ingen innehålls ändring endast ny version

Bakgrund

Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. Den skall konsekvent tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal, oavsett diagnos och vårdgivare.
Att utifrån medicinsk forskning, evidensbaserat handhavande och beprövad erfarenhet kring patientens kärlaccess minska risken för accessrelaterade infektioner och komplikationer.
Se Q Di 426 Kunskapsöversikt; tillgång till blodbanan-access

Syfte

Att skapa tydlig och lättförståelig lokal rutin för personal och egenvårdspatienter, detta som en del av kvalitetsarbetet kring patientens kärlaccess.
Samt förtydliga vikten av; att all personal samt egenvårdspatienter har en samsyn vad gäller avdelningens rutiner och arbetssätt

Till dialysavslut behöver du:

Plastförkläde, munskydd alt. visir
Rena handskar
Förband enl. SVP AV-fistel/ Graft

Utförande:

Ta på förkläde, munskydd , visir och handskar
Avsluta behandlingen enl. maskinens manual/instruktioner.

1. Använd valfri propp från maskinens slangset/primingpåsen och sätt dom på kanylslangarna när du kopplar ifrån.
   Ge tillbaka blodet tills återgivningslarm erhålles.
   Koppla ifrån artär- och venslangen så att slutet system bildas.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Tag bort dialysnålarna (ev. en i taget) och tryck över stickställena ca 10-15 minuter. Grafter komprimeras alltid i minst 15 min. Tänk på att trycka där nålen perforerat graftet, inte bara där utgången i huden är.
OBS! Det är en hårfin balans mellan tillräckligt tryck för att förhindra blödning och överdrivet tryck som kan orsaka tromboser.

Råd vid val av material vid avslut:
Första handsval är sterila kompresser och linda. Använd de sterila kompresserna som finns i avslutningssetet.
2:a Blodstillande vadd (Hemostop), sterila kompresser och linda.
3:e Mozaik, sterila kompresser och linda.

Blodstillande vadd (Hemostop) 7 kr/styck
Mozaik 30kr (2-pack)

När blödningen avstannat, inspektera stickställena; svullnad, hematom?
Sätt på förband. Enl SVP AV-fistel/graft alt. Enl. Q Di 432/433

Förband bör tas bort efter 4 timmar, annars finns ökad risk för irritation och infektion.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Elin Ågren, (eliag2), Sjuksköterska

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-113

Version: 8.0

Giltig från: 2026-11-17

Giltig till: 2028-11-17