

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Ing-Marie Dalberg, (ingjo167), Specialsjuksköterska
Granskad av: Anders Bergdahl, (andbe11), Överläkare
Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Giltig från: 2026-02-18

Giltig till: 2028-02-09

Tidig stickstart av Gore Acuseal graft Q Di 466

1 ex i avdelningspärm

Bakgrund

Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården.

Den skall konsekvent tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal, oavsett diagnos och vårdgivare.

Att utifrån medicinsk forskning, evidensbaserat handhavande och beprövad erfarenhet kring patientens kärlaccess minska risken för accessrelaterade infektioner och komplikationer. Se också Q Di 426: Kunskapsöversikt; tillgång till blodbanan-access.

GORE ACUSEAL Vaskulär graft har en tri-lagers konstruktion vilket möjliggör tidig kanylering inom 24 timmar efter implantation. Det är viktigt att steril teknik används tills det kirurgiska snittet hunnit läka.

Syfte

Att skapa tydliga och lätt förståelig lokal rutin för tidig stickstart i Acuseal graft där steril rutin krävs.

Till stickstart behöver du

Siterite

Sterilskydd för siterite.

STERIL GEL

Universal set.

Sterila handskar.

Steril rock.

Op munskydd.

Klorhexidinsprit 5 mg/ml för desinfektion.

Kanyl enl rek 17G vass

2 st 5 ml sprutor som är förfyllda med natriumklorid 9 mg/ml.

2 st IV 3000 barnstorlek.

1 paket Steristrip.

Ev Xylocainspray.

Uförande

Tänk på sterilt handhavande tills op-ärret är läkt!

Två personer behövs både vid start och avslut, en steril och en o-steril.

1. Kontrollera svirr, lyssna och känn. Studera armprotokoll och stickschema. För att se flödesriktningen i AV-graftet läs operationsberättelsen. Kontrollera med siterite och bestäm kanylernas placering. Stick inte närmaren än 3 cm från anastomosen. Stickteknik Ropeladder, det ska vara 1 cm avstånd mellan stickhålen. Spraya ev med Xylocainspray vänta 5 min. Ta på op mössa, op munskydd, sterila handskar och steril rock.
2. Duka fram och förbered framplockat material med hjälp av o-steril assistent. Lägg det sterila underlägget under armen.
3. Tvätta med Klorhexidinsprit, låt torka, sätt kanylerna, ultraljudslett (sterilt) i flödesriktningen. Ta foto. (första dialysen)
4. När du ska sticka sträck huden, stick med 45 graders vinkel. Stick försiktigt tills du får blodsvär och plana ut när du för in kanylen, fixera kanylens vingar med steristrip och sätt sterilt för band IV 3000 barn över stickhålet. Kontrollera kanylens läge genom att aspirera och flusha tillbaka med tom 5 ml spruta. Det ska varas lätt både ut och in. Vrid ej kanyl ögat om det känns bra. Installera 5 ml NaCl 9mg/ml när du säkerställt kanylens placering i kärlet.

Under dialys, kontrollera nålarna, arm, artär och venttryck ofta. Minst en gång per timma för att säkerställa nålplaceringen eftersom armen är svullen.

Förberedelse dialysavslut

Använd Universal set del två (sterila kompresser+duk)

Sterila handskar

Op munskydd

Op mössa.

Steril rock.

Steril sårfilm med absdyna.

Avslut

Osteril ssk avslutar behandlingen och drar kanylerna medan den sterila ssk komprimerar och lägger på förbandet.

OBS Viktigt att nålen dras ut i samma vinkel, nålsögats position som när den punkterades, (om nålen vrids efter punktionen skall den vridas tillbaka innan den dras ut.)

Tryck lätt över stickställena minst 10-15 min. Tänk på att trycka där graftet perforerats, inte över stickhålet i huden.

OBS!! Det är en hårfin balans mellan tillräckligt tryck för att förhindra blödning och överdrivet tryck som kan orsaka tromboser.

När blödningen avstannat, inspektera stickställena: svullnad? hematom?

Sätt på Steril sårfilm med absdyna samt linda.

Förbandet tas bort efter 4 timmar annars finns risk för irritation och infektion.

Avslutet får ej delegeras till undersköterska de två första veckorna eller tills op sår läkt och därefter måste det först föregås av tydliga instruktioner till undersköterskan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Ing-Marie Dalberg, (ingjo167),
Specialsjuusköterska

Granskad av: Anders Bergdahl, (andbe11), Överläkare

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Dokument-ID: NU10066-406871065-147

Version: 7.0

Giltig från: 2026-02-18

Giltig till: 2028-02-09