

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2024-10-11

Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Giltig till: 2026-10-08

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination (generella direktiv)

Q Di 505

1 ex i avdelningspärm, 1 kopia lm rum

Enligt HSLF-FS 2017:37 Generella direktiv om läkemedelshantering ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande. Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningsställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet samt kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer

Bedömningen av patientens behov av läkemedlet ska dokumenteras i patientjournalen.

Läkare skall ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering.

Gäller för Dialys och Njursviktsmottagningen NÄL

Indikation	Läkemedel	Dosering	Antal tillfällen utan läkar-kontakt	Kontraindikationer /Anmärkning
Vid smärta	T. Alvedon 500 mg	1-2 tabl	2 ggr	Överkänslighet mot paracetamol eller mot något hjälpämne
Vid oro	T Stesolid 5-10 mg	1 tabl	1 ggr	Överkänslighet. Sömnapné. Försiktighet vid andningsinsufficiens.

Vid benkramper	Inf.konc. Addex NaCl 4mmol/ml.	Inj. 5-20 ml i Venkammare	1 ggr	Addex NaCl: Försiktighet vid högt blodtryck.
Vid illamående	T. Primperan 10 mg Inj. Primperan 5-10 mg iv Supp. Primperan 20 mg	1 tabl 5-10 mg iv Supp. 20 mg	1 ggr 1 ggr 1 ggr	
Vid hypoglycemi	Inj. Glucos 300 mg/ml	10-30 ml iv.	1 ggr	Glukos 300mg/ml: inga kontraindikationer
Vid klåda	T Atarax 25 mg	1 tabl	1 ggr	Atarax: överkänslighet
Indikation	Läkemedel	Dosering	Antal tillfällen utan läkar-kontakt	Kontraindikationer /Anmärkning
Vid flödesproblem i CDK samt som profylax i tunnelerad CDK	Inj. Actilyse 1 mg/ml	Enl. PM Q Di 405		Actilyse: pågående blödning
Vid blödning från fistelnål och CDK	Surgicel Cyklocapron inj.vätska 100 mg/ml blodstillande vadd,	1-2 ml på kompress		Cyklocapron: överkänslighet
Vid lokalanestesi	Tapinkräm Spray Xylocain 10 mg /dos			Tapin: överkänslighet Xylocain: övekänslighet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-154

Version: 14.0

Giltig från: 2024-10-11

Giltig till: 2026-10-08