OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-13
Giltig till: 2028-08-04

# Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination (generella direktiv) Q Di 505

1 ex i avdelningspärm, 1 kopia lm rum

Enligt HSLF-FS 2017:37 Generella direktiv om läkemedelshantering ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande. Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningsställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet samt kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer

Bedömningen av patientens behov av läkemedlet ska dokumenteras i patientjournalen.

Läkare skall ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering.

Gäller för Dialys och Njursviktsmottagningen NÄL

| Indikation | Läkemedel | Dosering | Antal tillfällen utan läkar-kontakt | Kontraindikationer /Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| Vid smärta | T. Alvedon 500 mg | 1-2 tabl | 2 ggr | Överkänslighet mot paracetamol eller mot något hjälpämne |
| Vid oro | T Stesolid 5-10 mg | 1 tabl | 1 ggr | Överkänslighet. Sömapné. Försiktighet vid andningsinsufficiens. |



VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vid benkramper | Inf.konc. Addex NaCl 4mmol/ml. | Inj. 5-20 ml i Venkammare | 1 ggr | Addex NaCl: Försiktighet vid högt blodtryck. |
| Vid illamående | T. Primperan 10 mg<br>Inj. Primperan 5-10 mg iv<br>Supp. Primperan 20 mg | 1 tabl<br>5-10 mg iv<br>Supp. 20 mg | 1 ggr<br>1 ggr<br>1 ggr | |
| Vid hypoglycemi | Inj. Glucos 300 mg/ml | 10-30 ml iv. | 1 ggr | Glukos 300mg/ml: inga kontraindikationer |
| Vid klåda | T Atarax 25 mg | 1 tabl | 1 ggr | Atarax: överkänslighet |
| **Indikation** | **Läkemedel** | **Dosering** | **Antal tillfällen utan läkar-kontakt** | **Kontraindikationer /Anmärkning** |
| Vid flödesproblem i CDK samt som profylax i tunnelerad CDK | Inj. Actilyse 1 mg/ml | Enl. PM<br>Q Di 405 | | Actilyse:<br>pågående blödning |
| Vid blödning från fistelnål och CDK | Surgicel<br>Cyklocapron inj.vätska 100 mg/ml<br>blodstillande vadd, | 1-2 ml på kompress | | Cyklokapron: överkänslighet |
| Vid lokalanestesi | Tapinkräm<br>Spray Xylocain 10 mg /dos | | | Tapin: överkänslighet<br>Xylocain: övekänslighet |

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp**: Rutin

**Gäller för**: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar**: Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Granskad av:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID**: NU10066-406871065-154

**Version**: 15.0

**Giltig från:** 2026-08-13

**Giltig till:** 2028-08-04