

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Emma Johansson, (emmjo34), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-21

Giltig till: 2028-01-20

## Provtagning av PD-patient (Q Di 805)

Ett exemplar i avdelningspärm.

### Förändringar sedan föregående version

Endast mindre språkliga förändringar i denna revision.

### Startprover (ny patient i dialys)

B-Blodstatus, CRP, P-Elektrolytstatus, S-Ca-Jon, S-PTH, P-Leverstatus,

P-Järnstatus, P-Kobalamin, P-Folat, P-Urat, B-HbA1c (på alla).

**S-HBsAg, S-HCV, S-HIV, om det inte finns taget tidigare**

### Återbesök

Första månaderna tills stabilt fungerande dialys Elektrolytstatus, B-Hb, B-LPK, P-Glukos.

Vid stabil dialys B-Hb, P-Na, P-K, P-Ca, P-Glukos.

Prover på direkt frågeställning. LPK och CRP vid misstanke om infektion. S-Ca-Jon vid problem med justering av kalk/fosfatbalans. Blodstatus vid sjunkande B-Hb inkl.

B-Retikulocyter. vB-Bikarbonat std. tas vid hyperkalemi.

### Kvartalsprover

B-Hb (om transplanterad blodstatus), P-Albumin, P-Na, P-K, P-Ca, P-Fosfat, P-Urea, P-Kreatinin, P-Glukos, P-ALP, S-PTH, P-Ferritin och P-järn.

## Årsprover

B-Blodstatus, P-Elektrolytstatus, P-Leverstatus, P-Järnstatus, S-PTH, B-HbA1c.

## Patienter på väntelista för njurtransplantation

Enligt gällande rutin för transplantationsenheten. HLA-antikroppar - januari/april/juli/oktober. Om patienten fått blodtransfusion tas HLA-ak tre veckor efter infusion.

## Tranplanterade patienter

Koncentration av immunhämmande var 3:e månad. **Obs tas klockan 08:00 innan patient tagit sin medicin.**

## MRB-odling

Enligt gällande styrdokument från Vårdhygien. Om patienten har vårdats utomlands de senaste året eller vid misstanke om MRB.

MRB-odling om patienten byter behandlingsform till HD.

## PFT eller Peritoneal Ekvillibrerings Test PET utförs tidigast 4 veckor efter PD start och vid ultrafiltrationsproblem.

**24 timmars samling** av dialysat och urin utförs tidigast 4 veckor efter PD start och vid misstanke om inadekvat dialys. Uppföljning var 6:e månad.

PCR, Kt/V och Kreatininclearance erhålls vid 24 timmars samling

**PFT, PET och 24 timmars samling** provtagning och beräkning enligt Patient on line.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Emma Johansson, (emmjo34),  
Specialsjuksköterska

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-192

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2026-01-21

**Giltig till:** 2028-01-20