

Gäller för: Avdelning 42 NÄL

Innehållsansvar: Francine Herrblom, (mikhe19), Teamledare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-04

Giltig till: 2027-06-04

# Omhändertagande av patient som ska få en peritonealkateter (PD-kateter) inlagd

## Förändringar sedan föregående version

Vissa redaktionella förändringar med anledning av ny mall. Att skicka med jodhatt eller propp till operation är borttaget.

## Bakgrund och syfte

Dokumentet syftar till att informera omvårdnadspersonal på avdelningen om åtgärder inför att patient ska få peritonealkateter inlagd.

## Utförande

Ankomstsamtal av sjuksköterska dokumenteras i patientens journal under ”inskrivning ssk”. Läkarinskrivning finns förberedd innan inläggning. Provtagning, EKG samt narkosbedömning utförs via njursviktsmottagningen cirka 1 vecka före operation.

## Omvårdnadsåtgärder

### Information till patient

- Ingreppet utförs oftast i lokalanestesi.
- Eventuell smärta efter operation.
- Att man ej ska belasta magen utan vila resten av operationsdagen.

### **Speciell omvårdnad (före operationen)**

- PVK.
- Antibiotikaproylax ordineras i Läkemedelsmodul i journalen ges på operation.
- Vid diabetes: Insulindropp med droppräknare enligt ordination i Orbit.
- Resulax operationsdagens morgon.
- Se operationsplanering Orbit för eventuell ytterligare provtagning, ordinationer med mera.

### **Skötsel (före operation)**

- **Fasta från klockan 24.00**
- Dubbeldusch med Descutansvamp enligt NU-sjukvårdens lokala anvisningar angående preoperativ helkroppstvätt.
- Kontrollera att patient har ett ID-band
- Sängmärkning och sänggrindar på båda sidor.
- Ren bäddad säng.
- Ren patientskjorta samt strumpor.
- Tömma urinblåsan innan transport till operation. Vid misstanke om resurin kontrollera med bladderscan.
- Kontroll av märkning för exite sit

### **Ta med till operation**

- 5 etiketter för provtagning och 5 namnetiketter.
- PD-kateterset, finns på PD-mottagningen. 1000 ml NaCl och infusionsaggregat. Infusionsaggregat kopplas ej på avdelningen.
- Antibiotika.

### **Speciell omvårdnad (efter operationen)**

Se omvårdnadsprogram: Omhändertagande av patient som fått peritonealdialys (PD-kateter).

### **Observation**

- Smärta
- Förband, eventuell blödning
- Väl fixerad PD-kateter

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Avdelning 42 NÄL

**Innehållsansvar:** Francine Herrblom, (mikhe19), Teamledare

**Granskad av:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-7

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2025-06-04

**Giltig till:** 2027-06-04