OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Kardiologi
Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-09-02
Giltig till: 2028-09-02

Överkänslighet mot kontrastmedel vid coronarangiografi

Förändringar sedan föregående version

Delvis nytt dokument

Indikation

Anamnes på tidigare kontrastmedelöverkänslighet.

Planerad undersökning

1. **T Betametason 0,5 mg**. Ge 5 mg = 10 tabletter p.o 12 timmar före undersökningen. Löses i lite vatten.
   Samt 5 mg = 10 tabletter p.o 2 timmar före undersökningen.

2. **T Deslortadin 5 mg**. Ge 10 mg= 2 tabletter p.o 12 timar före undersökningen.
   Samtr 10 mg = 2 tabletter p.o 2 timmar före undersökningen.

Vid akut undersökning

Inj Solu-Cortef 200 mg iv omedelbart före undersökning

Munsönderfallande Desloratadin/Caredin 5 mg. Ge 2 st =10 mg

Vid allvarlig allergisk reaktion

Ges Adrenalin 0,1 mg/ml 0,3- 0,5 mg = 3-5 ml iv

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Granskad av: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska, Dinu Dusceac, (dindu1), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10067-1332077052-165

Version: 1.0

Giltig från: 2026-09-02

Giltig till: 2028-09-02