

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2025-09-30

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-09-30

Granskad av: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Veramacor Verapamil (Isoptin)

Revidering i denna version

Nytt med kontraindikation

Indikation

Förmakstakyarytmi, AV-nodal takyarytmi, idiopatisk kammartakykardi (RVOT VT, LVOT VT och fascikulära VT).

Kontraindikation

Digitalis intox

Kombination med Ivabradin

Beredning

Färdigberedd injektionslösning Veramacor 2,5 mg/ml.

Dosering

5 mg Veramacor (2 ml = 1 Ampull) ges som långsam intravenös injektion under 2-3 minuter.

Dosen kan upprepas efter 5-10 minuter och oftast är detta tillräckligt för att uppnå terapeutisk effekt.

Observation / Övervakning

- Kontinuerlig arytmiövervakning.
- Täta kontroller av blodtryck
- Kontinuerlig arytmiövervakning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Granskad av: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Dokument-ID: NU10067-2089204900-119

Version: 12.0

Giltig från: 2025-09-30

Giltig till: 2027-09-30