

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2025-03-26

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-03-26

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Digoxin

Revidering i denna version

Mindre förändring under beredning.

Indikation

Frekvensreglering vid förmaksflimmer och förmaksfladder.

Före behandling

Aktuella kalium- och kreatininvärden ska finnas.

Beredning

Injektionsvätska Digoxin 0,25 mg/ml spädes med 4 ml NaCl.

Dosering

Ges som en intravenös injektion under 3-5 min

Initialt 0,5 mg (2 ml) intravenöst

Därefter 0,25 mg (1 ml) intravenöst var 3:e timme tills tillfredsställande effekt har uppnåtts

Den sammanlagda dosen bör ej överstiga 1,5 mg (6 ml) intravenöst. Dosjustering görs framför allt med hänsyn till ålder, kaliumbalans och njurfunktion. Efter första dygnet sätts patienten in på peroral underhållsbehandling.

Snabbdigitalisering

Genomförs i akuta fall. En person som väger 70 kg (ej fetma) kan som riktvärde för snabbdigitalisering behöva 1 mg Digoxin intravenöst.

Observation / Övervakning

- Kontinuerlig arytmiovervakning.
- Mycket kärlretande, ges i så stor ven som möjligt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10067-2089204900-46

Version: 13.0

Giltig från: 2025-03-26

Giltig till: 2027-03-26