

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2025-06-13

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-06-13

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Seloken = Metoprolol

Revidering i denna version

Ändrad dos under tachyarytmier och tillägg under observation/övervakning

Indikation

Ventrikulära och supraventrikulära takyarytmier. Profylax och behandling av verifierad myokardischemi och smärta vid misstänkt eller säkerställd akut koronart syndrom. Frekvensreglering.

Blandning

Färdigberedd injektionslösning Seloken 1 mg/ml.

Dosering

Takyarytmier

Dosen och intervallet är individuellt beroende på patientens tillstånd.

Vanlig dos är 2,5–5 mg iv. Dosen kan upprepas med minst 2 minuters mellanrum mellan injektionerna och maxdos är 20 mg (=20 ml). 15 minuter efter sista injektionen ges fraktionerat Seloken peroralt var 6:e timme i 2 dygn, doseras av läkare.

Vid akut behandling av hjärtinfarkt

Vanlig dos är 2,5–5 mg iv. Dosen kan upprepas med minst 2 minuters mellanrum mellan injektionerna och maxdos är 15 mg (= 15 ml). 15 minuter efter sista injektionen ges fraktionerat Seloken peroralt var 6:e timme i 2 dygn, doseras av läkare.

Observation/Övervakning

- Försiktighet vid hjärtsvikt eller stor hjärtinfarkt
- Täta kontroller av blodtryck.
- Kontinuerlig arytmiövervakning.
- Inj Verapamil skall ej ges till patienter som behandlas med betablockad

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10067-2089204900-85

Version: 16.0

Giltig från: 2025-06-13

Giltig till: 2027-06-13