

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2024-09-16

Innehållsansvar: Cecilia Wiik, (cecwi), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2026-09-16

Granskad av: Cecilia Wiik, (cecwi), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Magnus Wahlin, (magwa1), Överläkare

PCI vid allergi mot kontrastmedel

Indikation:

Anamnes på tidigare känd allergi vid undersökning med röntgenkontrastmedel.

Profylaxrutin elektiva undersökningar

1. **T. Betametason 0,5 mg.** Ge 5 mg = 10 tabletter p.o 12 timmar före undersökningen.
Löses i lite vatten.
Samt 5 mg = 10 tabletter p.o 2 timmar före undersökningen.
2. **T.Desloratadin 5 mg. Ge 10 mg** (2 tabletter á 5 mg) p.o 12 timmar före undersökningen.
Samt 10 mg (2 tabletter á 5 mg) p.o 2 timmar före undersökningen

Vid akut undersökning

Inj. Solu-Cortef 200 mg omedelbart före undersökningen

Behandling:

Vid allvarlig allergisk reaktion ges Adrenalin 0,1 mg/ml, 0,3 – 0,5 mg = 3 – 5 ml i.v.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Cecilia Wiik, (cecwi), Specialsjuksköterska

Granskad av: Cecilia Wiik, (cecwi), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Magnus Wahlin, (magwa1), Överläkare

Dokument-ID: NU10067-2089204900-97

Version: 11.0

Giltig från: 2024-09-16

Giltig till: 2026-09-16