

Gäller för: Endoskopimottagning Uddevalla sjukhus, Endoskopimottagning NÄL

Innehållsansvar: Mikael Olsson, (miko1), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-07

Giltig till: 2027-08-07

Antikoagulantia, rutiner endoskopienheten

Förändringar sedan föregående version

Mindre språkliga justeringar.

Tidigare lokalt PM för endoskopienheten är avpublicerat och vi följer istället ny nationell riktlinje från SGF april 2022:

[Handläggande av antitrombotiska läkemedel hos patienter som genomgår planerad endoskopisk diagnostik eller terapi \(svenskgastroenterologi.se\)](https://www.svenskgastroenterologi.se)

Angående APC behandling och antikoagulantibehandling

Antikoagulantibehandling i samband med APC behandling kommenteras ej i riktlinjen från SGF.

I europeisk riktlinje från ESGE 2021 konstateras att APC används för många olika tillstånd och med mycket varierande inställningar avseende effekt, djup av vävnadspåverkan mm. Man bedömer att det finns för lite underlag för att ge rekommendationer.

I amerikanska riktlinjer från ASGE 2016 bedöms APC som lågriskingrepp (förutom om det används för tumörablation). Den form av APC som vi använder här vid behandling av angiodysplasier, strålproctit och GAVE ger mer ytlig påverkan på slemhinnan, bör liksom tidigare som rutin kunna bedömas som lågriskingrepp avseende antikoagulantibehandling. Individuell bedömning i särskilda fall.

Källförteckning

Svensk Gastroenterologisk förening

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Endoskopimottagning Uddevalla sjukhus,
Endoskopimottagning NÄL

Innehållsansvar: Mikael Olsson, (miko1), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10068-1061594200-7

Version: 4.0

Giltig från: 2025-08-07

Giltig till: 2027-08-07