

Rabiesprofylax till personer med ökad risk, infektionsmottagningen NÄL

Alla rekommenderas grundvaccination med 3 doser. (Dag 0, 7 och 21–28). Därefter rekommenderas följande grupper kontroll av antikropps nivå enligt nedan:

- Rabieslabbarbetare, titerkontroll var 6:e månad.
- Fladdermushanterare, titerkontroll med 2 års intervall ($>1,5$ IU/ml).
- Veterinärer med potentiell expositionsrisk (till exempel hantering av hundar/katter från riskområden), titerkontroll var 5:e år ($>0,5$ IU/ml).
- Övriga veterinärer/viltvårdare, enbart vaccin, grundvaccination.
- Utlandspersonal/resenär, enbart vaccin med 2 eller 3 doser beroende på ålder och immunsuppression.

Patienten bokas som hälsovård till sjuksköterskemottagning för provtagning med svar till vaccinationsansvarig läkare eller i andra hand till dagjour efter överenskommelse.

Titerkontroll antikroppar rabies skickas till Folkhälsomyndigheten. Patienten faktureras kostnaden enligt prislista (cirka 4200 kronor).

Patienten ska inte preliminärbokas i Elvis för framtida vaccinationer. Patienten ansvarar för att ta kontakt vid behov av ny titerkontroll.

Undantagsfall: Om boosterdos av rabiesvaccin, trots rekommendationer om titerkontroll, önskas får patienten bokas till subakut läkarmottagning för bedömning och ordination. Önskvärt att kontrollera serologiskt svar minst en gång efter grundvaccination.

Postexpositionsprofylax och ställningstagande till immunoglobulin vid exponering bedöms enligt sedvanlig rutin.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologi-hud-infektionssjukvård

Innehållsansvar: My Russberg, (myper1), Specialsjuksköterska

Granskad av: Katrin Olming Franc, (katol5), Överläkare

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10071-1039504452-145

Version: 1.0

Giltig från: 2026-08-17

Giltig till: 2028-08-17