

# Hepatit B, förenklad kontroll av patienter i stabil fas

## Förändring i denna version

### Bakgrund

## Bakgrund

Hepatit B indelas i fem olika immunologiska faser, de tre första faserna genomgår alla patienter.

Se PM “Hepatit B, kronisk, immunologiska faser”.

Patienter i immunologisk fas 1 eller 3 utan aktiv leversjukdom, där sjukdomsskattningen bedöms utifrån blodprovstagning och fibroscan, kan en förenklad kontrollrutin användas.

Dessa patienter kallas till hepatitmottagning (sjuksköterska) för blodprovstagning och fibroscan, med efterföljande brev/teltid till läkare.

För vidare information, se PM “Hepatit B, provtagningsrutiner vid nyupptäckt och kronisk infektion (olika immunologiska faser)”.

## Beskrivning

1. Respektive läkare avgör om förenklad kontroll med enbart hepatitmottagning hos sjuksköterska kan göras.
2. Patienten bokas på ansvarig läkares telefon/brevtidslista 2–3 veckor efter besök på hepatitmottagningen.
3. Respektive läkare avgör när nästa läkarbesök är aktuellt.

4. Om patienten hör av sig och hellre önskar ett traditionellt återbesök så ska detta bokas in via mottagningsköterskan samtidigt som läkaren underrättas.
5. Ifall patienten uteblir från hepatitmottagningen kontaktas patienten av sjuksköterska för att efterhöra orsak. Ny tid bokas.
6. Om patienten uteblir >2 gånger och inte är nåbar på telefon, kontrollerar sekreterare att adressen stämmer. Brev skickas till patienten med uppmaning att höra av sig till infektionsmottagningen. Därefter planeras telefontid/brevtid efter 6 månader.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Hematologi-hud-infektionssjukvård

**Innehållsansvar:** Katarina Lund, (katlu8), Överläkare

**Godkänd av:** Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10071-1782031320-221

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-07-09

**Giltig till:** 2027-07-09