

# Transport av patient till och från avdelning 27

## Revidering i denna version

Ingen förändring vid denna revidering.

## Syfte

Säkerställa transport av patienten.

## Beskrivning

- Bedöm om patienten är transportabel.
- Om allmänpåverkad patient är planerad för undersökning, till exempel röntgen, kontaktas avdelningsläkare för bedömning om undersökningen är relevant.
- Kom ihåg att alltid ha med telefon.

## Patient med syrgas

- Om patienten är allmänpåverkad och helt syrgasberoende – då ska en av personalen vara sjuksköterska.
- Kontrollera att syrgasmängden är tillräcklig före transport.
- Medtag extra syrgastub (för eventuellt apparatfel, hissfel etcetera)

## Patient med CPAP

- Vid transport av patient med CPAP ska minst tre personal medfölja, varav en sjuksköterska och en läkare.
- Helst en fjärde person som går i förväg för att ta ner hiss etcetera. Om narkospersonal hämtar patienten till IVA ska ändå infektionssjuksköterska eller infektionsläkare medfölja för rapportering.
- Kontrollera att syrgasmängden är tillräcklig före transport.
- Medtag extra syrgastub (för eventuellt apparatfel, hissfel etcetera samt Revivator).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Hematologi-hud-infektionssjukvård

**Innehållsansvar:** Anders Winstrand, (knuwi1), Överläkare

**Godkänd av:** Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10071-1782031320-272

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-01-28

**Giltig till:** 2028-01-28