

Gäller för: Reumatologimottagning Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Petra Hedlund, (pethe1), Vårdenhetschef
Granskad av: Jonel Pasula, (jonpa), Enhetschef
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-14

Giltig till: 2026-10-14

Hantering av antireumatiska läkemedel vid elektiv reumakirurgi

Förändring sedan föregående version

Ingen justering i denna version.

Bakgrund och syfte

Reumatologmottagningen använder *Svensk Reumatologisk Förenings* rekommendation för *Hantering av antireumatiska läkemedel vid elektiv reumakirurgi, 2023-04-18*, som gällande föreskrift och rutinbeskrivning med **följande tillägg**:

- Vid Infliximab (Remicade, Inflectra, Remsima) kan planerad operation ske mitt emellan två behandlingsinfusioner, vanligtvis efter 4 veckor.
- Vid alla planerade operationer är det dock opererande läkare som tar beslut om behandlingsuppehåll.

[Hantering av antireumatiska läkemedel vid elektiv reumakirurgi \(svenskreumatologi.se\)](https://www.svenskreumatologi.se)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Reumatologimottagning Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Petra Hedlund, (pethe1), Vårdenhetschef

Granskad av: Jonel Pasula, (jonpa), Enhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10072-1692804510-5

Version: 4.0

Giltig från: 2024-10-14

Giltig till: 2026-10-14