OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rutin

Gäller för: Uppvakning NÄL, Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL, Uppvakning 3
Uddevalla sjukhus, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL
Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska
Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-09-04
Giltig till: 2028-09-04

Bytesintervaller - Hygienrutiner

Revidering i denna version

Mindre justering.

Bakgrund

Vi har tagit fram en sammanställning för bytesintervaller av material för att lättare säkerställa en god patienthygien.

Syfte

Att säkerställa en god och säker hygien runt patienten.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor IVA/IMA/HPE, NU-sjukvården.

ALLA ÅTGÄRDER SKA DOKUMENTERAS I CHA

Material/Åtgärd	***Bytesintervaller***
Hårtvätt	Minst 1 gång/vecka.
Dusch	Minst 1 gång/vecka.
Sond-fixering	Vid behov.
NAVA sond	Hållbar för mätning 5 dag, sond 28 dag.
Sondsprutor	1 dygn.
Sondaggregat	1 dygn.
Tandborste	Vid behov.
Sugning: Kanister, sugpåse	Byt efter varje pat och påse v.b.
Sugslang	Varje morgon.
Slutet sugsystem + bubbelslang	Var 7:e dag.
Infusionsmaterial: Aggregat, 3-vägsslang, kranblock, förlängningsslang, swanlock	Var 4:e dag.
Infusionaggregat: Inf av blod, fettlösning ex Propofol	Blodkomponent: Byt var 4:e timme vid kontinuerlig transfusion. Byt mellan olika komponenter. SMOF kabiven: Byt var 4:e dygn om PVC-fritt aggregat (standard på IVA). Byt varje dygn om aggregat innehåller PVC. Propofol: Byt var 4:e dag.
Tryckset: Artär, CVP, PICCO	Var 7:e dag.
PVK	Vid behov.
Piccoset	Var 7:e dag fråga innan byte om behov finns för fortsatt Picco.
Inhalation Aeroneb	T-stycke och nebuliseringskopp byts var 28:e dag. 1-2ml NaCl körs igenom efter varje användning för att rengöra membranet. När inh ej används, sprita sladden.
Co2 kuvett, enpatients för Maquet och Hamilton	1 gång/vecka. Byts vid slangbyte eller vid behov.
Co2 kuvett ”Filterline”	Byt var 3.e dag.
Filter HME fukt	Byt varje morgon och vb.
Bakteriefilter på Servo-U	Byt filter var 24:e timme och endast på expirationsidan (även vid covid-19 och influensa). Dubbla bakteriefilter vid allmänfarlig smitta tex tuberkulos FHM-Allmänfarlig smitta. Om aktiv befuktning byt filter på expiration var 12:e timme el v.b.
Flexslang	Byt varje morgon och v.b.
Nebuliseringmask	Vid behov. Är enpatients.
Respslangar	Byt var 7:e dag.
Flergångs respslangar	Byt var 7:e dag. Diskas på anestesiprogram.
Befuktning: Kammare och slang	Byt var 7:e dag. Om slangen ej används (stillastående) kasseras befuktningssetet (kammare + slang) efter 24 timmar.
Tub: Sidbyte	Sidbyte endast om tryck har uppstått inspektera dagligen.
Trackband	Vid behov.
Trackstoma rengöring och förband	Lyft på förbandet inspektera. Byts var 3:e dag Förbandet innehåller bakterie dödande medel skall därför inte bytas dagligen. Tvätta med klorhexidinlösning 2mg/ml använd mjuk kompress 1g/dag.
Innerkanyl	Rengörs 2 gånger/dag och v.b.
Talventil	En låda med talventil räcker 5 dagar.
Talventil: filter	Byt varje morgon.

Talventil till HFG: Primedi-Phon Vent	2 månader OBS! Daglig rengöring. Se rutin: Talventil och talventil Primedi-Phon Vent - Användning och rengöring.pdf.
Peep mask gul	Spritas dagligen enpatients.
Pep pipa	Spritavtvättas dagligen byt efter 1 vecka, enpatient.
Revivator enpatients	Följer patienten.
Exspirationskasetten Maquet	Diskas tillsammans med testslang efter varje patient.
Flexi seal	Byt efter 28 dagar spolas varje pass.
Stomi platta	Byt var 3:e dag. Vid byte, tvätta runt stomin med extra skonsam kompress Non wowen och kranvatten.
Stomi Påse	Byt varje dag, tvätta runt stomin.
Dränagepåse	Byt var 3:e dag.
Urin :Timdiures	Byt 1 gång/vecka.
Urostomipåse	Byt dagligen.
Urinpåse	Byt var 7:e dag.
Kad temp	Byt var 3:e månad.
Buktryckset	Byt 1 gång/vecka.
Nefrostomi/pigtail/uretärkateter	Byt dränpåse var 7:e dag.
Förband: CVK, CDK, Artärkateter	Artärkateter: omläggning var 3:e dag CVK och Dialyskateter: byt till klorhexedinförband när det inte sivar blod längre. Därefter omläggning var 7:e dag.
EDA: Förband	Skall undvikas att bytas eller öppnas under behandlingstiden. Om förbandet måste bytas följ rutin om förbandsbyte enl hygienregler: EDA (epidural analgesi) användning, komplikationer och åtgärder på vårdavdelning.
EDA: Filter	Byt var 7:e dag
EDA: Aggregat	Byt Aggregat + Breivikpåse minst var 3:e dag. Ny Breivikpåse alltid nytt aggregat. Narop infusion byt var 24:e timme.
Hamilton: Slangar Filter:	Slangar: Byt mellan varje pat. Kan sparas på rummet hållbar 1vecka skriv datum. Filter: Dubbla filter, byts mellan varje användning.
Co2-kuvett	1 vecka. Följer patienten, enpatients.
Exspirationsventil Hamilton	Enpatients, sparas tillsammans med slangarna på patientrummet. Kan sparas i 1 vecka tillsammans med slangset.
Filter (fukt+bakterie) Hamilton	Enpatients, engångs bakterie/HME.
Airvo slangar	Byt var 7:e dag.
Högflödesgrimma/Trach	Byt var 7:e dag.
NIV/CPAP-mask	Enpaient eller flergångs. Daglig rengöring. Flergångsmasken diskas på anestesiprogram var 7:e dag.
Hexident, olja och vaselin	När det tar slut.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Uppvakning NÄL, Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL, Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-110

Version: 36.0

Giltig från: 2026-09-04

Giltig till: 2028-09-04