

Gäller för: Smärtenhet NU-sjukvården, Smärtenhet NÄL
Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-26

Giltig till: 2027-08-26

Morfin vid smärtsamma sår- lokalbehandling

Revidering i denna version

- Uppdaterad i giltighetstid.

Bakgrund

Enl. vissa rapporter kan man behandla smärtsamma sår, t.ex. liggsår och ulcerationer till följd av cancer med lokalbehandling med Morfin. Försöksvis även mot smärtsamma bensår. Den vetenskapliga dokumentationen för metoden får anses vara ofullständig. Metoden har använts relativt allmänt under många år och den kan nog räknas vara beprövad erfarenhet nu.

Syfte

Alternativ smärtbehandling vid smärtsamma sår.

Vilka berörs

Läkare och sjuksköterskor inom NU-sjukvården.

Metod

Morfinlösning 1 mg/ml sprutas i Aquacel eller motsvarande och läggs i såret. Förbandet fixeras på lämpligt sätt och byts 1 – 2 ggr per dag.

Om pat upplever sveda i såret vid applikationen kan man behandla med Xylocain 2% en kort stund innan. I enstaka fall kan prövas 2 – 3 mg/ml Morfin i lösningen.

Som alternativ kan man prova Morfin i gel form. Blanda 1ml Morfin 10mg /ml med 9 ml steril isoton hydrogel Appliceras lokalt i såret.

Systemupptaget av morfinlösningen kan man inte uppskatta men den har bedömts som oproblematiske. Dock rekommenderar vi en gräns vid 20 mg Morfin per dygn på opioidnaiva patienter.

Referenser

Palliative Medicine 1997; 11;325 – 326

[PAIN 1999 Mar; 80 \(1 – 2\); 121 – 125](#)

[New England Journal of Medicin Vol 325 No 16](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Smärtenhet NU-sjukvården, Smärtenhet NÄL

Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-208

Version: 11.0

Giltig från: 2025-08-26

Giltig till: 2027-08-26