

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Giltig från: 2025-03-19

Innehållsansvar: Elisabeth Casinge, (elica), Överläkare

Giltig till: 2027-03-19

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

## Barn – Corotrop – Doseringstabell

### Revidering i denna version

Inga förändringar, uppdaterad i giltighetstid.

### Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel som administreras via sprut- eller volympump.

### Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom AnOpIVA-kliniken

### Corotrop - Barn - doseringstabell

Sprutpump

**Blandning:** Corotrop 1 mg/ml, 5 ml (5 mg) blandas i 45 ml Glucos 5 %.

**Koncentration:** 0,2 mg/ml

**Startdos:** 0,5 µg/kg/min

**Normalintervall:** 0,30 - 0,70 µg/kg/min

Infusion tillsammans med Furosemid kan ge utfällning av Milrinon.

#### Infusionshastighet ml/tim

Vikt (kg)	4 kg	6 kg	8 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg
Dos									
<b>0,30</b> µg/kg/min	0,7	1,1	1,4	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2
<b>0,50</b> µg/kg/min	1,2	1,8	2,4	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12,0
<b>0,70</b> µg/kg/min	1,7	2,5	3,4	4,2	6,3	8,4	10,5	12,6	16,8

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi- operation- intensivvård,  
Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

**Innehållsansvar:** Elisabeth Casinge, (elica), Överläkare

**Granskad av:** Katarina Strid, (katst), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10086-1525759947-22

**Version:** 16.0

**Giltig från:** 2025-03-19

**Giltig till:** 2027-03-19