

Gäller för: Anestesi-operation-intensivvård gemensam, Intensivvårdsavdelning 26

Giltig från: 2025-01-08

IVA NÄL

Giltig till: 2027-01-08

Innehållsansvar: Elisabeth Casinge, (elica), Överläkare

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

## Barn - Noradrenalin - Doseringstabell

---

### Revidering i denna version

Förlängd giltighetstid.

### Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel som administreras via sprut- eller volympump.

### Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom AnOpIVA-kliniken

## Noradrenalin – Barn – doseringstabell

Sprutpump

<b>Blandning:</b>	Noradrenalin 1 mg/ml, 1 ml (1 mg) blandas i 49 ml Glucos 5 %.
<b>Koncentration:</b>	20 µg/ml
<b>Startdos:</b>	0,1 µg/kg/min
<b>Normalintervall:</b>	0,05-0,5 µg/kg/min
<b>OBS!</b>	Bör ges i CVK. Kan ges i perifer infart tills det finns en CVK.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi-operation-intensivvård gemensam,  
Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

**Innehållsansvar:** Elisabeth Casinge, (elica), Överläkare

**Granskad av:** Katarina Strid, (katst), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10086-1525759947-27

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2025-01-08

**Giltig till:** 2027-01-08