

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL
Innehållsansvar: Heike Apelman, (heiab), Ivasjuksköterska
Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-21

Giltig till: 2027-10-21

Barn - Venös provtagning

Revidering i denna version

- Uppdaterad i giltighetstid, inga förändringar.

Bakgrund/Syfte

Att tydliggöra handhavandet för en god och säker vård av barn.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på IVA.

Venös provtagning

Venprovtagning är att föredra på alla barn framför kapillära prover.

Skall man ta prover ofta är det lämpligt att sätta perifer nål, helst blå, för att dra prover ur. OBS! Går det glukosdropp i nålen kan man inte ta blodsocker även om man tagit slask.

Underlättas med hjälp av lokalbedövningsmedel, framförallt på de större barnen
Skall sitta på minst 30 minuter innan stick. När salvan tas bort kan man uppleva att kärlet inte syns längre. Vänta 10 – 15 min så syns det åter igen. Då har du drygt 120 min på dig innan effekten försvinner.

Barn mindre än 15 kg

Använd microtainer. Hämtas på LAB om vi behöver.

Blododling via venflon eller artärnål (när man sätter artärnål)

Alt 1. Blododlingsflaskor som till vuxna **minst** 4 ml i varje flaska.

Alt 2. Gul flaska att hämta på avd 23, räcker med bara den flaskan.0,4-5 ml.

Bäst om det fungerar med alternativ 1.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Heike Apelman, (heiab), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-32

Version: 7.0

Giltig från: 2025-10-21

Giltig till: 2027-10-21