

Gäller för: Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Giltig från: 2025-01-02

Innehållsansvar: Göran Anderzon, (goran), Överläkare

Giltig till: 2027-01-02

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Ulcusprofylax på IVA

Revidering i denna version

- Inga förändringar vid denna revidering.

Bakgrund

Det finns inget vetenskapligt stöd för att ge ulcusprofylax generellt till alla IVA-patienter. Många studier visar på ökad risk för pneumoni, tarminfektioner och andra biverkningar vid behandling med protonpumpshämmare (PPI). Risken för att IVA-patienter utvecklar ulcus har minskat betydligt på senare år, bl.a. till följd av god vård med minskad förekomst av smärta, oro och konfusion, liksom tidigare start av enteral nutrition.

Syfte

Skapa en rutin för ulcusprofylax till högriskpatienter som vårdas på IVA.

Vilka berörs

Läkare och sjuksköterskor på IVA/IMA.

Indikationer

Ulcusprofylax med protonpumpshämmare (PPI) bör därför endast ges till högriskpatienter.

Det gäller följande situationer:

- Pat som behandlas med syrasekretionshämmare sedan tidigare.
- Kortisonbehandling (motsvarande >7,5mg Prednisolon/dag)
- Högdos NSAID
- Patienter i svår cirkulatorisk chock med störd mikrocirkulation
- Patient med skallskada eller brännskada

Behandling

- Patienter som inte tillhör någon riskgrupp behöver ingen profylax.
- Patienter i riskgrupperna ges i första hand tabl Esomeprazol 20 mg, som kan lösas upp i vatten och ges per os eller per sond. Om magtarmkanalen inte är tillgänglig för tillförsel ges Inj Esomeprazol 40 mg intravenöst.
- Det är viktigt att dagligen omvärdera behovet av fortsatt behandling. Ju kortare behandlingstid desto lägre risk för komplikationer. Man bör sträva efter att avsluta behandlingen så fort som möjligt. När patienten kommit över på enteral/oral nutrition kan behandlingen avslutas.

Övrigt

För behandling av konstaterat ulcus hänvisas till kirurgklinikens rutiner.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL,
Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Göran Anderzon, (goran), Överläkare

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-89

Version: 5.0

Giltig från: 2025-01-02

Giltig till: 2027-01-02