

Urodynamisk undersökning

Syfte

Bedömning av de nedre urinvägarnas funktion.

Kontraindikationer

Pågående urinvägsinfektion

Pågående medicinering som kan påverka prostata eller blåsan negativt vid undersökning

Upplysningar på remiss

- Kort medicinsk bakgrund.
- Är fritt flöde utfört? (eller om det önskas hos oss)
- Prostatastorlek och fynd vid cystoskopi
- Aktuell frågeställning
- Aktuell medicinering
- Ska patient avsluta medicinering som kan påverka blåsan/prostatan?
- Önskas kombinationsundersökning där urethrasphinktertryck mäts under pågående cystometri
- Urethrasphinkterprofil (UPP)
- Behov av tolk

Förberedelser

Patienten ska hålla upp med medicinering som påverkar prostata eller blåsa, 7 dagar innan undersökning om inte ansvarig läkare angivit annat.

Utförande

Patienten får ligga på en brits. Vi monterar en tunn mätkateter i urinblåsan och en kateter i rektum där vi registrerar tryck. Under upprepade tillfällen tömmer vi och fyller upp blåsan med natriumklorid till patientens maxkapacitet. Patienten ska även försöka miktera under upprepade gånger.

Undersökningstid

1–2 timmar

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus, Klinisk fysiologi
NÄL

Innehållsansvar: Christin Rickardsson Luebke, (chrri4),
Biomedicinsk analytiker

Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10088-1721015962-140

Version: 1.0

Giltig från: 2026-01-12

Giltig till: 2028-01-09