

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Joanna Pong, (joapo1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-22

Giltig till: 2027-07-22

Glypressin som hemostatikum vid gynekologiska operationer

Revidering i denna version

Inga ändringar i denna version.

Sammanfattning/syfte

Glypressin, vars generiska namn är terlipressin, är en "slow release" och "long acting" vasopressinanalogue.

Glypressin kan användas i de fall det behövs ett lokalt hemostatikum, till exempel en extrauterin graviditet som sitter i uterushörnet, myomenukleation etc. Puls och blodtryck bör observeras på dessa patienter några timmar efter operationen. EKG-övervakning på grund av risk för bradykardi.

Åtgärder

Nedan följer förslag på spädning och rekommenderad maxdos.

1 mg Glypressin pulver spädes med medföljande 5 ml ampull koksalt.
Dessa 5 ml blandas med 45 ml koksalt = 1000 ug/50 ml vätska = 20 ug/ml vätska.
Maxdos totaldos vid injektion i mesosalpinx är 250 ug = 12,5 ml vid spädning enligt ovan.

Kontrollera puls, blodtryck, EKG 3 - 4 timmar postoperativt.

För mer information, läs dokumentation i preparatkartong.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Joanna Pong, (joapo1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10091-662869119-119

Version: 5.0

Giltig från: 2025-07-22

Giltig till: 2027-07-22