

Gäller för: Kvinnosjukvård

Giltig från: 2026-02-09

Innehållsansvar: Wasan Al Shididi, (wasal1), Överläkare

Giltig till: 2028-02-09

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Mottagningsoperation Gynekologisk mottagning NÄL

Revidering i denna version

Inga ändringar i denna version.

Syfte

Säkerställa ett enhetligt arbetssätt vid mottagningsoperationer på gynekologisk mottagning, NÄL Trollhättan.

Åtgärder

Preoperativ förberedelse

Inskrivning

- Operationsplanerare kontrollerar att ordination finns i Melior samt hälsodeklaration
- Patienten kommer att lämna urinsticka innan operation
- Patienten genomför dubbeldusch och tar premedicinering enligt ordination från inskrivningsbesöket
- Patienten fastar från kl 24:00 dagen innan operation, får dricka klara drycker fram till kl 06:00 på operationsdagen
- Patienten kommer till avdelning 35 enligt tidsangivelse från kallelse. Första patienten är färdig kl. 07.30 - 08.00
- Patienten erhåller ID-band, patientskjorta, operationsstrumpor, mössa, premedicinering samt PVK
- Patienten ska tömma blåsan innan operation
- Patienten kan få tablett Stesolid 5 mg vid behov, enligt ordination
- Patienten får Emla kräm vaginalt på avdelningen en timme innan operation är planerad. [Patientinformation bilaga 8.](#)

- Patienten kommer sedan i rullstol till vilorummet på gynomtagningen

Förberedelser på operationssalen dagen före operation

- Ställ undan apparatur som inte ska användas vid operation till exempel ultraljudsapparat

Förberedelse på operationssalen på operationsdagen

Undersköterska/sjuksköterska som ansvarar för mottagningsoperation utför följande uppgifter

- Följande material ska finnas på salen
 - Sterilt operationsset
 - Sterila handskar
 - Suturmaterial
 - Knivblad
 - Operationsgaller
 - Klorhexidinlösning
 - Lokalbedövning
- Ställ in läkemedelsvagn och diatermi i operationssalen samt akutvagn utanför
- Ta fram och starta sterilbord med nytt filter
- Ta fram blodtrycksapparat och POX-mätare
- Ytdesinficera alla ytor i rummet med Ytdesinfektion
- Öppna operationsset och vik ut samt öppna sterila handskar
- Sjuksköterska drar upp läkemedel som används för lokalbedövning och klorhexidinlösning hålls upp i rondskål
- Galler öppnas och sjuksköterska dukar upp inför operation
- Läkare sätter på munskydd, steriltvättar sig, tar på operationsrock och tar på sterila handskar själv.
- Patienten hämtas in till operationssalen. Personalen hälsar och presenterar sig
- Patienten sätter sig och blodtryckskontroll utförs. Koppla också på POX-mätaren. Kontrollera PVK:n
- Sjuksköterska tvättar med Klorhexidin lösning samt klär sterilt.
- Gå gemensamt igenom checklisten **Förberedelse** ([se bilaga 3](#)).

Operationsdagen

Operationsstart

- Gå gemensamt igenom checklisten **Timeout** ([se bilaga 3](#))
- Ge Rapifen enligt rutin, kontrollera att Naloxon, Lanexat samt Atropin finns i akutvagnen ([se bilaga 1](#))
- När Rapifen börjar ge effekt ger läkaren lokalbedövning, vänta minst två minuter.

- Notera tiden för operationsstart ([se bilaga 2](#))
- Operation utförs
- Sjuksköterska dokumenterar kontroller av vitalparametrar på narkoskurvan ([se bilaga 2](#))
- Kontroll av vitalparametrar utförs en gång vid operationsstart, en gång peroperativt, efter operationens slut samt vid behov.
- Pudendus med Marcain vid behov.

Operationslut

- Avsluta enligt checklista **Avslutning** ([se bilaga 3](#))
- Ta bort patientklädsel
- Patienten får en binda och nätbyxor
- Patienten tas till vilorummet, där sjuksköterska ger postoperativ information ([se bilaga 8](#)) och lämnar medicinpåse¹. Ring sedan till avdelningen som får hämta patienten.
- Instrument sätts i diskmaskinen
- Läkare dikterar operationsberättelse, registrerar i Gynop-registret samt skriver sjukintyg vid behov.
- Sjuksköterska skriver anteckning i Melior.
- Salen städas och desinficeras mellan operationerna., samt efter avslutad operationsdag

Postoperativ övervakning på avdelning 35

- NEWS-kontroller en timme efter ankomst till avdelning, enligt rutin
- Patienten erbjuds fika
- Patienten ska tömma blåsan innan hemgång och kontrolleras med bladderscan
- Vid behov finns medicinering ordinerat i Melior enligt operationsmottagningsmall²
- PVK tas bort och Hb kontroll görs vid behov.
- Utskrivningsmeddelande (finns i Korr/Intyg i Melior) lämnas till patienten.
- Alla ifyllda dokument läggs i låda på expeditionen på avdelning 35

Medicinpåse och patientinformation ska skickas med patienten från mottagningen till avdelningen.

Medicin som medföljer patienten från mottagningen till avdelningen

- 6 st - Tablett Brufen Retard 800 mg x 3
- 8 st – Tablett Alvedon 1 g x 4
- 2 st – Tablett OxyNorm 5 mg vid behov

Mottagningsoperationsmall Melior

- Tablett Ibumetin 400 mg, 1 x 3
- Tablett Alvedon 500 mg, 2 x 3
- Tablett Stesolid 5 mg, 1 tablett vid behov
- Alfentnil Hameln Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml, 1 vid behov, maximalt 2 mg
- Midazolam Hameln Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 mg/ml, 1 – 2 vid behov

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Wasan Al Shididi, (wasal1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10091-662869119-164

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-09

Giltig till: 2028-02-09