

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Joanna Pong, (joapo1), Överläkare

Granskad av: Madelaine Jurland Stigborn, (madst4), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-06-10

Giltig till: 2026-06-10

Antibiotikaproylax vid gynekologisk kirurgi

Revidering i denna version

Inga ändringar.

Bakgrund

Vid vissa typer av gynekologiska operationer finns risk för spridning av infektiösa agens.

Sammanfattning/syfte

Förebygga infektion.

Åtgärd

Antibiotikaproylax ges inför följande operationer

- Hysterektomi
- Prolapsoperation med implantat (nät)
- TVT/TVT-O

Mediciner som ges

- Tablett Bactrim forte 1 x 1
- Tablett Flagyl 400 mg 3 x 1

1. Vid allergi mot sulfa utesluts Bactrim och där ges enbart Flagyl eller
2. Som ovan + Cefuroxim 1,5 g intravenöst vid anestesis inledning

Medicinen ges i samband med premedicinering cirka 1 timme innan operationen.

Dokumentation.

Mediciner ordineras/signeras i läkemedelsmodulen i Melior.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

OBS Har ovanstående antibiotikaproylax bortglömts eller ifall beslut om operation som normalt omfattas av profylax tas peroperativt, kan samma mediciner ges som intravenös peroperativt. (finns för intravenöst bruk på operationsavdelningen).

Andra gynekologiska operationer: på ansvarig läkares ordination.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Joanna Pong, (joapo1), Överläkare

Granskad av: Madelaine Jurland Stigborn, (madst4), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10091-662869119-3

Version: 5.0

Giltig från: 2024-06-10

Giltig till: 2026-06-10