

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Joanna Pong, (joapo1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25

Vaginal hysterektomi i dagkirurgi – smärtlindring peri- och postoperativt

Revidering i denna version

Inga ändringar i denna version.

Åtgärd

När vaginal hysterektomi är planerad som ett dagkirurgiskt ingrepp krävs en justering av smärtlindring peri- och postoperativt jämfört med det som ges till patienter som opereras ineliggandes. Bakgrunden till detta är att rutiner för anestesimetod skiljer sig, generell anestesi/narkos med larynxmask vid dagkirurgi respektive morfinspinal vid ineliggande kirurgi. Detta ger ökat/förändrat behov av peri- och postoperativ smärtlindring vid dagkirurgisk operation så att patienten blir tillräckligt smärtlindrad för att kunna gå hem.

Vid vaginal hysterektomi i dagkirurgi ska följande smärtlindring ges/ordineras av operatör

Perioperativt

- Marcain Adrenalin, 2,5 mg/ml + 5 µg/ml (2,5 %) anläggs lokalt. Totalt 60 ml varav 50 ml läggs i och runt portio samt 5 ml i vardera adnexstjälk.

Bemöda dig om att också lägga bedövningen i de vävnader som blir kvar i vaginaltoppen, inte bara i preparatet.

Postoperativt

- T. Brufen Retard 800 mg 1 x 3 (6 styck)
- T. Postafen 25 mg 1 vid behov (2 styck)
- T. Oxycontin 10 mg 1 x 2 (4 styck)
- **Inte** OxyNorm

Postoperativ smärtlindring ordineras i Orbit direkt efter avslutad operation.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Joanna Pong, (joapo1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10091-662869119-67

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25