

Gäller för: NU-sjukvården

Innehållsansvar: Anette Nilsson, (aneni13), Överläkare

Granskad av: Fanny Björk, (fanbj1), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Maria Andersson, (maran126), Chefsjuksköterska

Giltig från: 2025-05-20

Giltig till: 2027-05-20

*Kan även användas som rutin för vårdenheter utanför NU-sjukvården
som har avtal med Hälsan & Arbetslivet.*

Screening av personal avseende MRSA

Revidering i denna version

Ingen förändring i denna version.

Bakgrund

MRSA står för Meticillinresistent *Staphylococcus aureus*. Detta innebär att dessa stafylokocker är resistent mot vanligt stafylokokk-penicillin. MRSA kan lätt spridas inom vården och kan ge allvarliga konsekvenser varför det är viktigt att förebygga spridning. Screening för tidig upptäckt tillsammans med välfungerande hygienrutiner är grundläggande verktyg i detta arbete. MRSA omfattas av smittskyddslagen.

Syfte

Upptäcka förekomst av MRSA innan personal deltar i vårdarbete så att smittspridning inom vården förebyggs.

Åtgärder

Provtagning

Provtagning ska göras på all vårdpersonal i patientnära arbete som under senaste året har arbetat med patientnära sjukvårdsarbete utomlands, vårdats på sjukhus eller genomgått avancerad poliklinisk behandling (till exempel dialys, cytostatikabehandling, såromläggningar, katetrisering eller större tandingrepp).

Hälsan & Arbetslivet kontaktas för provtagning (tfn: 010 – 441 45 00).

Personal som ofta alternerar mellan arbete i NU-sjukvården och utomlands kontaktar Vårdhygien för överenskommelse om screeningsplan.

OBS! Personal som provtas ska ej ha arbetat med vårdarbete de senaste 24 timmarna.

Prover ska inte tas under antibiotikabehandling (önskemål om 2 veckors antibiotikafrihet).

Provtagningslokaler

- Näsa
- Svalg
- Perineum
- **Provtag dessutom från eventuella riskfaktorer**
- Sår/hudlesjoner/eksem.
- Stomier (till exempel kolostomi, urostomi), tag prov från stomikant.
- Urin om personen har (eller har haft under den senaste veckan) KAD eller annan urinvägskatetrisering.

Arbete i väntan på provsvar

Personal med sår/hudlesjoner/eksem eller annan riskfaktor avvaktar provsvar innan återgång till patientnära arbete.

Handläggning av provsvar

Negativt provsvar

Negativt svar meddelas av Hälsan & Arbetslivet.

Positivt provsvar

Positivt svar meddelas av Hälsan & Arbetslivet. Den anställda remitteras därifrån till Infektionsmottagningen som kallar för undersökning, provtagning och vidare information. Vid aktuella sår/hudlesjoner/eksem eller annan riskfaktor ska den anställda sjukskrivas eller stängas av med smittbärrpenning i väntan på besöket på Infektionskliniken.

Vederbörande tilldelas en patientansvarig läkare på Infektionskliniken (MRSA-PAL) som bedömer smittsamhetsgraden och när återgång till vårdarbete kan ske. Samråd sker med läkare på Vårdhygien om riskfaktorer/riskarbete föreligger. Den anställda kan ibland behöva avstängas från vårdarbete enligt smittskyddslagen och uppbär då smittbärrpenning.

Smittspårning

Vid fynd av MRSA på avdelning/enhet ska ingen rutinmässig provtagning av personal ske.

Vid enstaka smittspårningar kan provtagning av personal bli aktuellt. Detta sker då på initiativ av läkare på Vårdhygien som kontaktar Hälsan & Arbetslivet för information om vilka som ska provtas. Respektive enhets smittspårningsansvarige för aktuellt ärende får efter detta kontakta Hälsan & Arbetslivet för tidsbokning av personal som är berörd.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: NU-sjukvården

Innehållsansvar: Anette Nilsson, (aneni13), Överläkare

Granskad av: Fanny Björk, (fanbj1), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Maria Andersson, (maran126), Chefsjuksköterska

Dokument-ID: NU10092-2087047004-5

Version: 12.0

Giltig från: 2025-05-20

Giltig till: 2027-05-20