OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Elin Salonen, (elice2), Specialistläkare
Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare
Giltig från: 2026-08-18
Giltig till: 2028-08-14

PD-kateter: in, byte eller ut

Revidering i denna version:

Reviderad under rubrik: Operationsbord/läge

Bakgrund

Gäller för patienter som förbereds för peritonealdialys eller ska avsluta sin behandling.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patienter med behov av CAPD-kateter.

Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation, NU.

Anestesiförslag

Premedicinering:
Alvedon

Anestesikort vid perkutan operation:
Narkosövervakning- Propofol TCI/ Remifentanil TCI+ LA operatör

Anestesikort vid laparoskopisk operation:

Intubation-Propofol/Remifentanil-TCI/Sevofluran/Rocuronium.
Noradrenalin

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Praktiska råd

Tänk på att det är njursviktande patienter. Aktuella prover spec. kalium skall finnas. Ta reda på om vätskerestriktion ska tillämpas.

Bladderscan preoperativt och tappning om >100ml i urinblåsan

Operatören ska ha röntgengenomlysning vid inläggning för kontroll av kateterläge.

Operationsbord/läge:

Om operation sker på hybridsalen används det operationsbord som finns på salen. Vid annan sal används Uni-bord.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Elin Salonen, (elice2), Specialistläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-107

Version: 9.0

Giltig från: 2026-08-18

Giltig till: 2028-08-14