

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-03-06

Giltig till: 2027-03-04

ERCP anestesirutin

Revidering i denna version:

Ingen revidering.

Bakgrund

ERCP är en undersökning och behandling av gallvägarna och bukspottskörteln, exempelvis stenar i gallgången, sjukdom i gallvägar eller bukspottkörteln.

Syfte

Säker anestesi vid ERCP.

Vilka berörs

Anestesisjuksköterskor och anestesiläkare, operation, NÄL.

Anestesi

1. Intubation RSI (Aspirationsrisk) Propofol/Remifentanil-TCI/Sevofluran/Suxameton.
2. I vissa fall där aspirationsrisk bedöms stor använd Alfentanil vid induktion, följt av Remifentanil-TCI.
3. Fenylefrin alt. Noradrenalin v b.

Utrustning

Braun sprutpump för TCI remifentanil.

Ev Braun volympump för noradrenalin.

Avslutning/Postoperativt

Rutinmässigt behövs ingen syrgas vid transport till UVA, om patienten är vaken.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-122

Version: 6.0

Giltig från: 2025-03-06

Giltig till: 2027-03-04