

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2024-10-10

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-10-10

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Hexvix - instillation

Revidering i denna version

Ingen revidering

Bakgrund

Hexvix är ett diagnostiskt medel som instilleras i urinblåsan för att lättare se tumörer. Resultatet är att tumörceller lyser röda till skillnad från normala celler som är blå. Hexvix har endast effekt tillsammans med blått ljus. Patienten får inte ha en pågående urinvägsinfektion i samband med Hexvix-instillationen därför skall en nitritsticka tas. Blåsan skall vara tom då instillationen görs. OBS kontrollera urinodlingssvar i Melior. Då svar ej finns, kontakta ansvarig operatör. Patienter som berörs är nyupptäckta blåscancerar och multipla blåstumörer.

Syfte

Att skapa en rutin för en säker hantering vid instillation av Hexvix.

Vilka berörs

All personal operation Uddevalla

Patienten tas till det preoperativa centret, alternativt förberedelserummet, för att förberedas inför operationen.

Metodbeskrivning

Instillationstid

Hexvix skall vara kvar i blåsan en timma efter instillation och patienten kissar därefter. Om patienten inte klarar att behålla Hexvix i en timma räcker det med 15 minuter. Tiden mellan instillation och operation måste vara mer än en timme. Om det har gått mer än tre timmar sedan instillationen tills operationsstart skall operatören avgöra huruvida operationen skall genomföras eller ej.

Tillvägagångssätt

Patienten byter om till operationskläder. Be patienten lämna urinprov i en mugg för att kunna kontrollera en nitritsticka före Hexvix instillationen. Patienten tas till det preoperativa centret för att förberedas inför operationen. Personalen på operationssalen ansvarar för när Hexvix skall instilleras och är behjälpliga vid förberedelserna.

Alla moment skall utföras med steril utrustning och aseptiska rutiner. Hexvixinstillationen görs med engångskateter och enligt steril rutin.

Instillation

- Tvätta med Hibiscrub
- Sätt kateter och töm blåsan.
- Vid negativ Nitrit blandas Hexvix enligt instruktioner i medföljande bipacksedel av sjuksköterska och den instilleras därefter av sjuksköterska eller undersköterska.
- Då instillationen är gjord dras katetern.

Dokumentation

Dokumentation av Hexvix-instillation sker i Orbit under fliken Checklistor i rutan för premedicinering och Annat läkemedel, skriv vilket klockslag instillationen gjordes. Nitrit-svar dokumenteras under samma flik i rutan för Kissat/tappad.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-144

Version: 9.0

Giltig från: 2024-10-10

Giltig till: 2026-10-10