

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2026-03-25

Giltig till: 2028-03-24

# Näsreponering

---

## Revidering i denna version

Under premedicinering och anestesikort

## Bakgrund

Patienten kommer fastande direkt till operation med remiss och bedöms av operatören. Om åtgärd behövs lägger operatören in patienten som en akutoperation i Orbit.

## Syfte

Standardisera och förbättra omhändertagande av patient vid näsreponering.

## Vilka berörs

Anestesisjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation NÄL.

## Anestesiförslag

### Premedicinering:

Se separat rutin "[Premedicinering för ÖNH- och käkpatienter](#)". Vanligtvis ges Paracetamol och Cox-2 hämmare intravenöst innan anestesistart.

### Anestesikort:

Intubation med Propfol, Alfenanil, Celocurin, Sevo/luft, men vanligtvis går det bra med larynxmask. Detta får avgöras av ansvarig anestesilog.

## Utrustning

Standard

## Blodgruppering/Bastest

Nej/Nej

## Praktiska råd

Patienten behöver inte byta om helt, räcker med att ta på skjorta.

## Operationsbord/läge

Universalbord med huvudring, höger arm utmed sidan, dropp i vänster.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation NÄL

**Innehållsansvar:** Jan Creutz, (jancr), Överläkare

**Godkänd av:** Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10093-1252922689-178

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-03-25

**Giltig till:** 2028-03-24