

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2024-08-30

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-08-30

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Perkutan stenextraktion

Revidering i denna version:

Revidering under: Anestesiförslag, Utrustning, Patient
Samt ny rubrik; Premedicinering, Positionering

Bakgrund

Operationen görs på patienter med stora njurstenar, oftast större än 2 cm och även multipla eller korallstenar som ej lämpar sig för ESVL behandling

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patient vid perkutan stenextraktion

Vilka berörs

All personal Operation Nu-sjukvården

Premedicinering

Alvedon 1g, Oxycontin 10 mg

Anestesiförslag

Anestesikort: Intub: Propofol/Fentanyl/Esmeron/Sevofluran alt
Propfol - Ultiva/Esmeron/Sevofluran

Robinul (ev)

Ondansetron

Utrustning

Standard. Patientvärmare, örontemp, KAD, TOF

Blodgruppering/bastest

Ja/ja

Förberedelser

Håravkortning flanken, efter operatörens markering.

Praktiska råd

Stora mängder NaCl spolvas peroperativt och samlas upp i karuseller - från KAD, från ultraljudspumpen och från uppsamlingspåsen via draperingen. Det är stor risk för att NaCl läcker ut runt om patienten vilket gör det svårt att exakt mäta spolvätska in och ut. Viktigt är att operationsteamet tillsammans kontrollerar spolvätska in och ut och dokumenterar detta under Trender i Orbit. Meddela operatör vid stor differens.

Röntgenläkare kan vara behjälplig med punktion av njurbäckenet.

Positionering

Operationsbord

Huvudplatta, centralplatta, förläning nertill, boots, hängmatta, armstöd på motsatt operationssida, band att låsa andra armen.

Patient

Patienten ligger i ryggläge med boots, knicken vid arcusbågen. Benplattan skall kunna vinklas och höjas. Slajda neråt. Sänk ben på fjärrkontroll och tippa hela bordet en aning nedåt. Vinkla operationsbordet för att den opererade sidan skall bli åtkomlig.

Bilder på upplägg samt placering av utrustning finns i pärm på sal 1.

Risker

Nedkylning av patienten vid lång operationstid med mycket spolning

Avslutning/Postoperativt

Patientvärmare kvar tills patienten lämnar op-salen

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-190

Version: 7.0

Giltig från: 2024-08-30

Giltig till: 2026-08-30