

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Börje Lantz, (borla), Överläkare

Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-01-21

Giltig till: 2027-01-21

Piercing och smycken i samband med anestesi och operation

Revidering i denna version:

Revidering under rubrik: Dokumentation

Bakgrund

Alla smycken såsom örhängen, halsband, klockor och ringar skall tas bort innan operation. Piercingsmycken bör också avlägsnas.

Syfte

Regler för piercing och smycken i samband med anestesi och operation

Vilka berörs

Personal på operationsavdelningen och vårdavdelningar inom NU-sjukvården

Om piercingsmycken sitter på eller i:

- **Ansikte och mun**, skall de tas bort innan anestesi och operation. De kan orsaka andningshinder och blödningar.
- **Närheten av operationsområdet**, skall de tas bort. Det minskar risken för infektioner eller att de trillar ner i operationssåret. Slitskador kan uppstå om piercingsmycket fastnar i något.
- **Genitalia**, är det inte alltid nödvändigt att ta bort piercingsmyckena vid kateterisering, men smyckena bör tas bort om de går igenom urinröret.

Vid användning av:

- **Diatermi**, om smycken/ringen sitter så att ström kommer att passera dem skall de tas bort. I övrigt kan de sitta kvar. De skall då täckas över med gummihandske, kompress eller tejp. Ringar som ej kan avlägsnas tejpas vid ev. diatermi Uppstår oklarheter, använd bipolär diatermi.
- **Röntgen**, i anslutning till operationen, skall smycken tas bort. Det finns risk för att skador kan döljas bakom smyckena.

Vid risk för:

- **Tryckskador**, skall smyckena tas bort.

Dokumentation

- Om piercingsmycken sitter kvar, dokumentera var de sitter och vilken typ av smycke de är.
- Efter operationen kontrollera att smyckena sitter kvar och dokumenterar detta.
- Tar man bort piercingsmycken innan operation skall det dokumenteras.
- **Dokumentation** sker under *Anestesifas* eller *Operationsfas /Checklista/Checklista inför operation/ Piercing/smycken borttaget*.
Enbart fritext om piercing/smycken ej tagits bort

Låsringstång för att kunna ta bort en *Captive bead ring* finns:

NÄL: I lådan för ”piercingång och ringsåg i överflytten
Uddevalla: I anestesiförrådet i skåp ”H” (längst fram på höger sida) på C-op

Typer av smycken och sätt att ta bort dessa:



Stud

Är en rak stav med fastsatt kula i ena ändan och ett borttagbart clips i den andra ändan. Det är ett mycket vanligt smycke och förekommer mest i öronen.



Captive bead ring

Är en inkomplett ring som under spänning, knyter fast en liten kula med gropar på vardera sidan. Genom att bända isär ringen och ta bort kulan kan man lossa smycket. Små ringar går att ta bort för hand. Till större ringar behövs en tång, för att sära på ringen. Smycket sätts i öron, näsa, läppar och genitalia.



Barbell

Är en rak stav med en kula påskruvad i varje ända. Lossa kulan genom att skruva moturs. Det kan vara nödvändigt att hålla staven med en tång. Sitter oftast i tunga, navel, i nacke, men även i andra områden på kroppen.



Labret

Är en rak stav med en kula påskruvad i ena ändan och en platta fastsatt i den andra. Smycket tas bort genom att skruva av kulan från staven. Sitter vanligtvis i läppar, ögonbryn och tunga.



Eyebrow eller surface barbell

Har ett U-format skaft som sitter under skinnet, med en kula i varje ända. En eller båda kulorna går att skruva loss. De sitter oftast i nacke, över sternum och mellan ögonen.



Tunnel och plug

Är en spolformad plugg som håller en kanal öppen genom skinnet. Pluggen hålls på plats med hjälp av en O-ring i var ända. Placeringen i öronsnibbarna.



Nostril screw

Är en S-formad skruv med en platt del och på den sitter oftast en liten juvel. Genom att ta tag i den delen av smycket som syns utanpå näsan och snurra på smycket så lossar det. Sitter i näsa.



Septum channel retainer

U-format smycke som sitter i nässeptum. Smycket går lätt att ta bort.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Börje Lantz, (borla), Överläkare

Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-191

Version: 7.0

Giltig från: 2025-01-21

Giltig till: 2027-01-21