

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-03-13

Giltig till: 2027-03-12

Funduplicatio- Laparoskopisk

Revidering i denna version

Reviderad under rubrik: Anestesiförslag. Operationsbord.

Bakgrund

Kirurgisk åtgärd för att förhindra magsäcksinnehåll att läcka upp i matstrupen. En annan indikation är mekaniska problem när magsäcken ligger i thorax samt mer sällsynt inklämt bråck.

Syfte

Säkert omhändertagande av patienter som ska genomgå funduplicatio.

Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, anestesiläkare, undersköterskor, Operation, NU.

Anestesiförslag

Premedicinering

1. Alvedon Oxycontin

Anestesikort

2. Intubation RSI (Aspirationsrisk)
Propofol/Alfentanil/Remifentanil-TCI/Sevofluran/Suxameton
3. Noradrenalin
4. Överväg Ducanto sug på operations sug

Utrustning

5. Salemsond nr 18 inför operationsstart, därefter sond Ch 36 efter ordination av kirurg

Operationsbord/läge

Universalbord. Dubbla benremmar.

Blodgruppering/Bastest

Ja/Nej

Praktiska råd

Operationsbordet tippas med fötterna nedåt.

Benvärmare.

Postoperativt

UVA.

Rtg pulm kan bli aktuellt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-20

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-13

Giltig till: 2027-03-12