

Gäller för: Uppvakning NÄL, Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus, Uppvakning 1 Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Helena Liwenborg, (helli40), Ivasjuksköterska
Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-04-24

Giltig till: 2027-04-22

Vinklingskirurgi / Vinkelosteotomi– Postoperativ vård

Revidering i denna version

Endast förlängd giltighet för dokumentet. Ingen förändring.

Bakgrund

Utförs vid förslitningsförändringar på in- eller utsidan av knät då patienten är för ung för proteskirurgi. En vinkelosteotomi med platta proximala tibia utföres.

Syfte

Att patienter som opereras med ortopedisk vinklings- och rotationskirurgi skall få en god och säker postoperativ vård.

Vilka berörs

Personal på UVA som vårdar patienter efter vinklings- och rotationskirurgi.

Åtgärder

Innehåll och metodbeskrivning

Kirurgiskt ingrepp

Vid operationen sågas benet av och vinklas om så att den friska ledytan belastas, antingen in-eller utsidan av knät. Benet fixeras därefter med en metallplatta och skruv.

Anestesiform

Spinalbedövning eller generell anestesi. Patienten kan ha erhållit Femoralisblockad.

Medicinsk behandling och omvårdnadsåtgärder

Cirkulation

Kontroll av distalstatus med cirkulation, sensibilitet och motorik.
Trombosprofylax ges enligt ordination av operatör.

Nutrition

Patienterna får äta och dricka.

Hud/slemhinna

Ett kylförband appliceras på knät för att minska svullnaden och smärta. Isen byts då den tinat, även nattetid.

Kylförbandet och en extra omgång is skickas med patienten hem.

Smärta

Smärtlindras enligt ordination från operatör och generella direktiv. Operatören ordinerar postop. smärtpaket och detta skickas med patienten till avdelningen/FDV-enheten.

Mobilisering

Det opererade benet ska förses med stödstrumpa innan mobilisering.

Patienten får gå upp för toalettbesök första kvällen men ska ha kryckor och får endast markeringsbelasta.

Övrigt

Patienten är inneliggande, vanligtvis FDV vård.

Patienten ska kontrollröntgas dagen efter operationen, men kan gå hem därefter, utan att invänta röntgensvaret. Ring röntgen på operationsdagen och beställ tid för kontrollröntgen följande morgon.

Antibiotikaproylax (Cloxacillin) x 3 iv efter ordination av operatören.

Medgranskare

Ioannis Karikis, (ioaka1) Överläkare Ortopedkliniken, NU-sjukvården

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Uppvakning NÄL, Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus,
Uppvakning 1 Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Helena Liwenborg, (helli40), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-248

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-24

Giltig till: 2027-04-22