

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-08-30

Giltig till: 2026-08-30

KAX blandning vid artroskopiska operationer

Revidering i denna version

Ingen revidering, förlängning av giltighetstid.

Bakgrund

KAX blandning används rutinmässigt vid artroskopiska ingrepp i smärtstillande syfte

Syfte

Att skapa enhetliga rutiner angående KAX blandning vid artroskopiska operationer.

Denna version ersätter gamla versionen (Barium ID 40082) på grund av att Morfin special preparat saknas i marknaden.

Tillvägagångssätt

Före operationsstart ges injektion:

- Mepivacain 5mg/ml med adrenalin 5mg/ml
intraartikulärt/subacromiellt 20 ml
- Vid ingreppets slut ges 20 ml intraartikulärt en blandning av (3 alt beroende på styrka i morfin preparat – alternativt 3 är det ”gamla” blandningen med Morfin special):

ALTERNATIV 1

- Ketorolac 30mg/ml 1 ml
- Morfin 1 mg/ml 4 ml
- Ropivacain 10mg/ml 9 ml
- Natriumklorid 9mg/ml 6 ml

ALTERNATIV 2

- Ketorolac 30mg/ml 1 ml
- Morfin 10 mg/ml 0,4 ml
- Ropivacain 10mg/ml 9 ml
- Natriumklorid 9mg/ml 9,6 ml

ALTERNATIV 3

- Ketorolac 30mg/ml 1 ml
- Morfin special 0,4 mg/ml 10 ml
- Ropivacain 10mg/ml 9 ml

Vid fotleds- och armbågs-artroskopi ges mindre volym av blandningen – vanligen ca 10ml

Vid korsbandsrekonstruktioner ges även

- I hamstringsslitsen: Ropivacain 10mg/ml 7ml + NaCl 9mg/ml 13ml = 20ml med hjälp av (uterin-) kateter
- I tagställesincisionen: Ropivacain 10mg/ml 7ml + NaCl 9mg/ml 13ml = 20ml

Om ingreppet sker, på medicinsk indikation, i epidural anestesi eller i plexus brachialis-blockad, ersätts Ropivacain i den intraartikulära blandningen med NaCl 9mg/ml.

Detta gäller ej spinal anestesi

Ketorolac utgår vid uppenbara kontraindikationer till NSAID

Operatörens önskemål om avsteg från rutinen noteras i

Operationanmälan i Orbit 5.

Premedicinering

Paracetamol

Oxycodon

NSAID preparat i alla former utgår

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-31

Version: 3.0

Giltig från: 2024-08-30

Giltig till: 2026-08-30