

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-13

Perifer kärlkirurgi – bypass, trombektomi mm

Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Bakgrund, Anestesiförslag, Utrustning, Praktiska råd, Operationsbord/läge. Ny rubrik: Postoperativt. Ändrad titel.

Bakgrund

Kärlkirurgi vid extremitetsischemi syftar till revaskularisering och innefattar flera olika ingrepp.

Patienterna har ofta omfattande komorbiditet (diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, KOL, njursvikt)

Syfte

Säkert omhändertagande av patient som ska kärlopereras.

Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation NU-sjukvården.

Anestesiförslag

Premedicinering

- Alvedon.
- Oxycontin kan ges om inte patienten kan få EDA

Anestesikort

- Spinal och EDA med kateter (SpEDA) + sedering.
 - Marcain spinal 5 mg/ml för spinalt bruk
 - Carbocain 20mg/ml m adrenalin för testdos i EDA
 - Överväg sedering med [Dexdor](#) som alternativ till Propofol
 - Noradrenalin
 - Vid behov av uppstart av EDA under op, oftast efter 2-4 timmar, ge Carbocain 20mg/ml efter behov, ofta 5-6 ml som får upprepas en gång per timme.
 - Ropivakain 2 mg/ml i EDA postoperativt.
- Vid kontraindikation mot ryggbedövning LM alt intubationsnarkos med remifentanil och sevofluran som underhåll

Utrustning

Standard. Värmemobil. Tempmätning. Warmcloud halvkropp. Hälskydd. Brauns volympump för noradrenalin. Timdiures. Ev artärtryckset m kabel och tryckplatta.

Blodgruppering/bastest

Ja/ja

Praktiska råd

- Patienten körs i säng till Hybridsalen där överflytt till op.bord sker.
- Grov PVK helst i höger arm då pumpar ställs på hö sida.
- Patienterna skall vara välhydrerade.
- Målblodtryck efter ordination anesthesiolog och kärlkirurg.
- Kontrollera antibiotikaordination och ge preoperativt.

Operationsbord/läge

Magnusbord med lång topp. Armarna i armskenor. Huvudet mot dörren om inte kirurger anger annat.

Slida op bordet max mot salens ingång.

Om röntgen skall göras fäll in vänster armbord.

KAD

Patienten har KAD från avdelningen.

Postoperativt

Kvarligger på UVA över natt för cirkulation och blödningskontroll.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-34

Version: 7.0

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-13