Paracetamol till barn – generell ordination

Förändring i denna version

Ingen revidering

Syfte

Definiera dosering av Paracetamol till barn för preoperativ administrering i hemmet.

Vilka berörs

Sjuksköterskor på AnOpIVA, NU-sjukvården.

Riktlinje

Ordinationen gäller barn som skall genomgå poliklinisk operation. Dagen innan operation ringer förälder upp för att få information. Paracetamol ges som tablett, mixtur eller stolpiller beroende på vad förälder/barn föredrar. Per os dock att föredra då rectal administrering ger sämre biotillgänglighet.

Paracetamol ges i hemmet c:a 1,5 – 2 timmar innan planerad operationsstart. **Viktigt** att informera förälder att denna dos är högre än vad som står angivet på förpackningen i förhållande till barnets vikt och att denna dos är en engångsdos inför operationen. Efter operationen kan man i hemmet vid behov ge Paracetamol enl. dosering på förpackningen men endast 3 ggr till under operationsdygnet.

Preparatnamn: Alvedon, Curadon, Panodil, Reliv

Beredningsformer:

Suppositorier	60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1g.
Mixtur	24 mg/ml
Tabl/brustabl/ Munlöslig tabl	500 mg, 1 g

Dosering med laddningsdos: Max 30 mg/kg peroralt
Praktiskt att ge 1 ml/kg av mixtur = 24 mg/kg. ex. vikt
7 kg = 7 ml Max 40 mg/kg rectalt.

Vikt (kg)	Mixturdos	Tablett	Suppositorier
5 kg	5 ml		125 mg + 60 mg
10 kg	10 ml		250 mg + 125 mg
15 kg	15 ml		500 mg + 60 mg
20 kg	20 ml	500 mg	500 mg + 250 mg
25 kg	25 ml	500 mg + 250 mg	1 g
30 kg	30 ml	500 mg + 250 mg	1 g
35 kg	35 ml	1 g	1 g
> 40 kg	40 ml	1 g	1 g

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Elisabeth Casinge, (elica), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-45

Version: 9.0

Giltig från: 2026-05-18

Giltig till: 2028-05-15