

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2026-01-20

Giltig till: 2028-01-20

# Snarkoperation med laser, LUPP

---

## Förändring i denna version

Reviderad under rubrik ”Bakgrund”, ”Vilka berörs” och ”Anestesikort”.

## Bakgrund

LUPP betyder laser-uvulo-palato-plastik och görs på patienter med social snarkning. Det innebär att en del av mjuka gommen och uvula avlägsnas med hjälp av laser.

## Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för patient som ska opereras för snarkningsbesvär.

## Vilka berörs

Anestesiläkare, anestesisköterskor, operationssköterskor och undersköterskor på operation på NÄL.

## Anestesiförslag

## Premedicinering:

se separat rutin ”[Premedicinering för ÖNH-och käkpatienter](#)”.

## Anestesikort:

Intubationsnarkos med TIVA/TCI: Propofol och remifentanyl, och rokuronium.  
OBS, högst **30% syrgas** vid laserbränning!

Oral intubation med lasersäker tub. Finns i storlek 4, 5 och 6. Tuberna har dubbla kuffar som båda fylls med NaCl.

## Utrustning

Standard, TOF och BIS.

## Blodgruppering/Bastest

Ja/nej

## Operationsbord/läge

Universalbord med huvudring. Höger arm utmed sidan, vänster arm på armbord. Narkosapparaten långt ner på höger sida.

## Risker

Explosionsrisk med syrgas, se *Rutin för [säkerhetsaspekter vid arbete med medicinsk laser](#)*.

## Avslutning/Postoperativt

Väck patienten sittande/höjd huvudända. Extubera ev. direkt till CPAP-mask. Sömnapné patienter som har CPAP behandling hemma, skall ha med sin CPAP till operation och vårdas på UVA över natten.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation NÄL

**Innehållsansvar:** Jan Creutz, (jancr), Överläkare

**Godkänd av:** Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10093-1252922689-55

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-01-20

**Giltig till:** 2028-01-20