

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-03-13

Giltig till: 2027-03-12

Splenectomi elektiv (laparoskopisk eller öppen)

Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Operationsbord/läge

Bakgrund

Operation där patienterna oftast har någon blodsjukdom. Patienterna kan vara infektionskänsliga, koagulationspåverkade och steroidbehandlade.

Vid akut traumatisk mjältskada hänvisas till rutin [Akut laparotomi](#).

Syfte

Säkert omhändertagande av patient vid elektiv splenectomi.

Vilka berörs

Anestesisjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation NU-sjukvården.

Förberedelser

1. Optimering av ev bakomliggande hematologisk sjukdom, ev. hematologkonsult
2. Blod och koagulationsstatus preoperativt, överväg Rotem.

Anestesiförslag

Premedicinering:

3. Alvedon. Oxycontin om ej TEDA

Anestesikort:

4. Intubation- Propofol/Remifentanil-TCI/Sevofluran/Rocuronium.
5. TEDA om öppen operation och ibland även vid laparoskopisk om stor konverteringsrisk, kolla med operatör.
6. Noradrenalin

Utrustning

7. Standard.
8. Värmemobil med möjlighet till övertrycksinfusion.
9. Brauns sprutpump för TCI remifentanil.
Braun volympump för noradrenalin.
Ev CADD-Solis pump för standardblandning i TEDA.
10. V-sond.
11. KAD.
12. Tempmätning.
13. Artärnål med tryckset.
14. Överväg Cardiac output mätning!

Blodgruppering/bastest

Ja/ja

Praktiska råd

15. Grov perifer nål.
16. Ev trombocyttransfusion.
17. Läget på patienten vid laparoskopi kan både ge ventilations-perfusions mismatch och cirkulationspåverkan

Operationsbord/läge

18. Universalbord.
19. Vid laparoskopi ligger patienten på höger sida på bordet.
20. Vinklingen på op bordet vid revbensbågen.
21. Hö arm läggs snett uppåt, vä arm på kuddar.
22. Bordet placeras med huvudändan lite snett i salen.
23. 2 stöd bakom ryggen på patienten och 2 remmar, en över höft och en över ben.
24. Återställ vinklingen innan operatören syr igen.

Extrautrustning

Ev förlängningsskenor.

Mobilisering/massage

Kontrollera uppläggningsen av patienten fortlöpande och massera armar och ben.

Risker

Blödning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-58

Version: 7.0

Giltig från: 2025-03-13

Giltig till: 2027-03-12